




532

H. Asellius

19/3 59.

Johannes Daniel  
Fremshenius.  
2432.





PRÆLECTIONES ACADEMICÆ  
MEDICÆ,  
*SIVE*  
SPECIMEN  
NOVÆ  
PATHOLOGIÆ  
THEORETICO-  
PRACTICÆ,

SECUNDVM  
RECENTISSIMAM MEDENDI METHODVM  
STAHLIANAM

BREVITER CONCINNATVM,

NUNC VERO

IN GRATIAM TIRONVM PRACTICORVM  
IN LVCEM EDITVM

A

D. A. J. F.

---

FRANCOFVRTI ET LIPSIAE,

Apud GEORGIVM CHRISTOPHORVM FELEHNERVM,  
M DCC X V.

PRÆLECTIONES ACADEMICÆ  
 MEDICÆ  
 SIVE  
 SPECIMEN  
 NOVE  
 PATHOLOGICÆ  
 THEORETICÆ  
 PRACTICÆ  
 SECUNDUM  
 RECENTISSIMAM MEDICÆ METHODUM  
 STALLIANAM  
 REVERENDI CONCISSIMÆ  
 MAGIS ALEXANDRI  
 IN GRÆCIÆ VITÆ PRÆLECTIONIBUS  
 IN LECCE AUSTRIÆ  
 D. A. J. E.  
 FRANCISCO ROSTKOWSKI  
 GEORGII CHRISTOPHII PLEHNII  
 MDCCCX



Qui huncce librum pandis, Le-  
 ctor benevole, fortasse putabis,  
 Autorem ejus id ipsum etiam egisse,  
 quod plerique in Compendiis suis Pra-  
 cticis, qui post morborum defini-  
 tiones, nec illas interdum accura-  
 tas, ordine quidem therapeutico sic fa-  
 tis eleganti, sed nullo profusus habito  
 selectu, innumera fere remedia sub  
 uno titulo recensent, imo augent, &  
 nova excogitant, aut ad minimum com-  
 mendant, adeoque ex aliorum ore fa-  
 bulam narrant; Ast manum de no-  
 stris Tabulis, si tantum fabulas quæris,  
 X 2      quas

quas conscribendi, & formulas artificiose componendi Autoris nostri non fuit animus, sed ille potius, ut in his Prælectionibus suis Academicis veritatem sine coloribus nudam ostenderet, atque auditoribus suis brevem quidem, sed rectam, & ad felicem Praxin ferentem, viam monstraret. Unde secutus est etiam Celeberrimum hujus ævi Practicum, Excellentissimum Stahlum, cujus fundamenta Medicinæ novæ firmissima, & Methodum medendi prorsus fere infallibilem, ingenue tradidit, inque Compendii formam & Tabularum ordinem, tam accurate tamque breviter redegit, ut uno quasi intuitu omnia simul compareant & perspecta esse possint. Hinc, quum modo laudati Viri Methodus curandi huc usque penitus fere latuisset, ideoque à multis anxie

anxie desideraretur, hoc egregium MStum, cum ad nostras etiam manus perveniret, tanto magis, ut prelo subiceretur, dignum judicavimus. Haud multas quidem L. B. in hoc Specimine Practico invenies formulas, sed, quod Anima Praxeos Medicæ est, fidelem & accuratam morborum Historiam, Methodum & Medicamenta, quibus semper tuto fidere licebit. Tu modo aggredere hoc iter jucundissimum, ante oculos Tibi jam est via regia à qua non poteris in devia deflectere, cum Ducem habeas Naturam, & comitem ipsam Experientiam, quæ te certe in Praxi nunquam deserent, sed semper ad exoptatum finem perducent. Vale & fave.



INDEX TABULARVM.

Tab. I.

De Morbis in genere.

Tab. II.

De Plethora.

Tab. III.

De Hæmorrhagiis in genere.

Tab. IV.

De Congestionibus.

Tab. V.

De Affectibus Arthritico-spasticis.

Tab. VI.

De Convulsivis affectibus.

Tab. VII.

De Febribus in genere.

Tab. VIII.

De Febribus intermittentibus.

Tab. IX.

De Febribus acutis & malignis. &c.

Tab. X.

Tab. X.

De Inflammatione & Febribus Inflammatoriis.

Tab. XI.

De Variolis & Morbillis.

Tab. XII.

De Febribus, quarum Indoles nondum satis est perspecta.

Tab. XIII.

De Dysenteria.

Tab. XIV.

De Hæmorrhagia narium.

Tab. XV.

De Hæmoptysi.

Tab. XVI.

De Vomitu cruento.

Tab. XVII.

De Mictu cruento.

Tab. XVIII.

De Fluxu Hæmorrhoidali nimio.

Tab. XIX.

Tab. XIX.

De Fluxu Hæmorrhoidali suppresso.

Tab. XX.

De Hæmorrhoidibus cæcis.

Tab. XXI.

De Fluxu Mensium nimio.

Tab. XXII.

De Suppressione Mensium.

Tab. XXIII.

De Hæmorrhagia Uteri nimia.

Tab. XXIV.

De Lochiorum Fluxu suppresso.

Tab. XXV.

De Malo Hypochondriaco-Hysterico.

Tab. XXVI.

De Asthmate convulsivo.

PATHO-

(o)

## PATHOLOGÆ THEORETICO- PRACTICÆ

TAB. I.

DE

### MORBIS IN GENERE.

I. *Morbus est status præternaturalis hominis vivi.*

II. *Signa sunt:*

- 1.) *Recessus aut defectus quicunque à reliquo, quem alias in actionibus suis Principium vitale observat, more, ordine, vigore, deflectens.*
- 2.) *Motus extraordinarii & insoliti, aut præter consuetum gradum & ordinem agendi intenti, ut plurimum tamen ad læsiones præoccupandas, aut reparandas, directi.*
- 3.) *Actionum reliquarum, non solum vitalium & animalium, sed & ipsarum rationalium perturbatio, cessatio & aliqualis neglectio.*
- 4.) *Dolor, aut certe intimior dispositio, molestia aut anxietatis velut inexplicabilis perceptio.*

III. *Subiectum solet esse*

- 1.) *Homo vivus,*
- 2.) *præ brutis,*
- 3.) *Fœminæ præ viris,*
- 4.) *Otio, intemperantiæ, aut certe lautiori diætæ dediti, molliter educati,*
- 5.) *lascivi, meticulosi, speculabundi sive suspicaces.*

A

IV. *Diff.*



IV. *Differentia* defumitur

- 1.) A causis: alii enim morbi oriuntur & foveantur à vitis humorum & partium solidarum, adeoque à causis materialibus; alii innituntur causis magis immaterialibus, motibus nimirum erroneis aut perveris.
- 2.) Ab impetu & duratione: alii sunt chronici, alii acuti, imò peracuti.
- 3.) Ab eventu: alii sunt lethales, alii non lethales.
- 4.) Ab habitudine ad curationem: alii sunt curabiles, alii incurabiles.
- 5.) A prægressa medicatione: alii sunt corrupti, alii non corrupti.
- 6.) Ab inducta assuetudine: alii sunt habituales, alii nondum obfirmati.
- 7.) A Recursu plus minus statò: alii sunt periodici, alii vagi.
- 8.) Ab invadendi & grassandi modo: alii sunt contagiosi, alii non contagiosi; alii sunt sporadici, alii epidemici, alii endemii.
- 9.) A more & indole: alii sunt maligni, alii minus maligni.
- 10.) A symptomatibus: alii sunt legitimi, alii spurii sive nothi.
- 11.) A circumstantiis ætatis & temporis: alii sunt congrui, alii incongrui.
- 12.) Ab origine: alii sunt hæreditarii, alii adventitii.
- 13.) A sede causæ morbificæ: alii sunt idiopathici, alii symptomathici.

V. *Prognosis*.

- 1.) Multi morbi curantur sine concursu Medici, seu medicatione artificiali, nulli vero citra *viuipissimam* Naturæ.
- 2.) Morbi sine omni medicatione sibi relictis, & sponte decurrentes longe evidentius indolem suam manifestant, longe cæritus statas periodos & dies criticos observant, longe securius & constantius conualescunt,

aut

aut longe tranquillius ad mortem properant, quam qui variis medicamentis & medicationibus, præsertim manifestius operantibus, tractantur.

- 3.) Morbi hæreditarii à crebriori recurfu in habitum & assuetudinem deducti, raro perfecte rursus tolli atque extirpari, sed solum mitigari possunt.
- 4.) Plenariam alicujus visceris, aut partis organicæ destructionem resarcire ac reparare, nec *Artis*, nec *Naturæ* concessum est.
- 5.) Morbi certis ætatibus, aut certis anni temporibus & tempestatibus familiares, si hi ipsis circumstantiis respondeant, & congruant, minus periculosi sunt, quam qui multum inde deficiunt.
- 6.) Viscerum, aliarumque partium, etiam nobiliorum læsiones pedetentim invalescentes, longe facilius tolerantur, quam qui repentina violentia inferuntur.
- 7.) Morbi, qui ab initio quidem causas materiales pro fundamento & fomento habuerunt, demum vero in consuetudinem degenerarunt, ita plerumque insolescunt, ut etiam, sublatis istis causis materialibus, pertinaciter tamen perdurent, aut recurrant.

VI. *Remedia* seu auxilia sunt vel

•) *Dietetica*, h.e. prudens regimen non solum circa cibum & potum, sed & calorem & refrigerationem per vestimenta & stragula, aut concalescentias conclavium, moderandum, item admonitiones & consilia pro refrænantis, aut evitandis Animi commotionibus patheticis.

•) *Chirurgica*, v. g. VSio, Scarificatio, Hirudines, Setacea, Fonticuli, Vesicatoria, Frictiones, Pediluvia, quin omnes actiones manuales, Deligationes, Repositiones artuum, Incisiones, Trepanatio, Cataractæ depositio, Paracentesis,

A 2

γ) *Phar.*

7) *Pharmaceutica* seu stricte sic dicta Medicamenta, quæ respiciunt

- a) Materiam morificam, ejusque
  - 1.) Correctionem, ut Alterantia,
  - 2.) Eliminationem, ut Evacuantia, Diuretica, Diaphoretica, Salivantia, Emmenagoga.
- B) Motus quoslibet
  - a) excitulant pleraque jam enumerata Evacuantia, item Analeptica & Confortantia, ut & Aphrodisiaca, &c.
  - b) Corrigit & sedant Specifica, Anodyna, Pa-  
regorica.

VII. *Methodus* medendi cum cautelis Practicis.

- 1.) Medicus esto Naturæ minister non magister: motus & intentiones Naturæ imitetur & juvet; raro maturare aut corrigere audeat.
- 2.) Nunquam moveat, seu etiam motum excitulet, nisi materia sit mobilis, & viæ expeditæ.
- 3.) Si Natura materiam morificam emotionem jam intendit, aut plane suscepit, caveat, ne superaddito stimulo fiat nimum.
- 4.) Facilius est motus in solidum supprimere, quam moderare.
- 5.) Specifica, ut & Evacuationes particulares non adhibeat, nisi præmissis universalibus, h. e. instituta antea, ubi opus, Venæsectione, Catharsi, Sudatione, &c. non vero his omnibus simul in omnibus individuis adhibitis.

PLETHORA.

*Plethora* notanda sunt

1. *Signa diagnostica*, quæ sunt

- 1.) Reliqua sanitas satis illibata.
- 2.) Appetitus bonus & tolerantia quoque ciborum assumptorum optima, bonæ concoctionis & digestionis index.
- 3.) Somnus bonus & profundus, quietus etiam valde, nisi quod calidiore loco & tempore inquietus, seu jectigabundus evadat.
- 4.) Insomnia anxia, sive præfigurationes onerum portandorum, incendiorum, effusionum sanguinis.
- 5.) Segnities ad paulo laboriosiores motus, aut sub his repentina fatigatio, præcipue vero inter ambulandum, currendum, aut scandendum per loca acclivia, respirationis velox difficultas.
- 6.) Aspectus in paulo habitioribus, valde rubicundus, in macilentioribus vero, aut strenuo labori assuetis, qui utrique valde amplas venas habere solent, insignis harum plenitudo & distensio.
- 7.) Sub levi sudatione obtingens sensus in cute levissime punctorius, quasi hic illic seta leviter compungerentur.

II. *Subjctum*. *Plethora* communiter obnoxii sunt homines

- 1.) ætate juniores,
- 2.) otio dediti,
- 3.) Diæta plena ac lauta utentes,
- 4.) antea evacuationibus sanguinis, sive spontaneis, sive artificialibus largioribus assueti, aut vitæ generi laborioso addicti, qui labores deposuerunt, & tamen tantis utuntur cibis.

III. *Differentia.* Plethora est

- a) vel 1) abundantia, ubi sanguis simpliciter abundat;  
 2) exundantia, ubi jam congeries & stagnationes minatur, aut eruptiones molitur.  
 β) vel 1) Simplex, ubi sanguis in se bonus, sed superfluus Naturam onerat.  
 2) cum Cacochymia, i. e. dyscrasia sanguinis, imprimis spissitudine sanguinis conjuncta.

IV. *Prognosis.*

Plethorici non solum variis morbis, v. g. Hæmorrhagiis, Febris continuis, Inflammationibus &c. propter plethoram sunt expositi; sed & si alias ob causas morbos incurant, v. g. Vulnere, Fracturas, Luxationes, Febres intermittentes, Variolas, &c. his ipsi gravius & periculosius decumbunt.

V. *Remedia.*

- 1.) Victus parior & diæta tenuior.
- 2.) Motus corporis laboriosior, non impetuosus quidem, interim tamen diutius continuandus, frequentius repetendus, quæ physice quidem satis efficacia, sed ob molliem & desidiam plerorumque subjectorum, moraliter fere inutilia sunt. Restat itaque
- 3.) Sincera sanguinis educio per Venæ sectiones & scarificationes.

VI. *Methodus medendi.*

- 1.) Libertas alvi promoveatur & expediatur ante sanguinis missionem.
- 2.) Visio in junioribus in brachio, in provecioribus in pede adornetur circa Æquinoctia, Luna decrescente
- 3.) In foeminis prægnantibus Venæ sectio in brachio instituat circa medium gestationis tempus, quo alias sane hunc fluxum expertæ sunt.

4.) Post

- 4.) Post ventilationem sanguinis subjungi possunt Analeptica & lenia Diaphoretica ad æqualem sanguinis distributionem promovendam.

VII. *Cautele Præticæ*

- 1.) Plethorici per scarificationem insufficientem, aut Venæ sectionem parciorem, facile in febres acutas, affectus arthriticos aliaque mala præcipitantur, ita, ut sanguinis missione plane abstinuissè, quam eandem non sufficiente quantitate adornasse præstiterit.
- 2.) Plethoricis Alexipharmaca calidiora, præsertim cum regimine sudorifico data, Diuretica violentiora, præsertim cum regimine, o. o. o. ta acriora, & quælibet sanguinem fortiter commoventia, item Balnea & Pediluvia fervidiora aut frequentiora, repentini & violenti corporis morus, vini generosioris immodestior ingurgitatio, summe noxia, quin lere venena sunt.
- 3.) Venæ sectio generalius omnis generis habitus, sexus & ætatis hominibus convenit; scarificatio vero non nisi corporis habitui spongiosiori, affectibus magis sursum ad caput, collum, scapulas, humeros &c. vergentibus, & chronicam pertinaciam ac repulsionem minitantibus, ætati etiam adhuc vegetiori debetur, & frequentiores repetitiones, ad minimum singulis anni quadrantibus, poscit.
- 4.) Evacuaciones sanguinis assuetæ, licet interdum nullum positivum usum habere videantur; neglectæ tamen & omisæ positivum damnum afferunt.



# HÆMORRHAGIIS IN GENERE.

*Hæmorrhagiarum notanda est*

## I. Differentia.

- 1.) Aliæ sunt Activæ, aliæ magis Passivæ;
- 2.) Criticæ, Chronicæ;
- 3.) Period. & statæ, Vagæ,
- 4.) Tolerabiles & innoxie, aliæ nimie, h. e. nimis frequenter repullulantes, aut nimis impetuose invalescentes, quæ proprie hujus loci sunt.

## II. Subjctum, Hæmorrhagiis facilius & frequentius obnoxii sunt homines

- a) ætate juniores,
- b) temperamento Sanguineo, vel Cholerico, aut Melancholico cum his mixto, præditi,
- c) Indole animi activiores, iracundi,
- d) Statu corporis plethorici, evacuationibus sanguinis assueti,
- e) Dietæ lautiori, inprimis vinosæ dediti.

## III. Prognosis.

- 1.) Incredibilem ferè sanguinis jacturam homo tolerare potest sine lethali exitu.
- 2.) Hæmorrhagiæ, ut ut enormes, sibi vero relicte, donec illarum impetus sponte recedat, non tam facile tabidos affectus, hydropicos, aut cedematosos tumores post se trahunt, quam quæ variis artificiis, inprimis vero adstringentibus fortioribus tractatæ & oppressæ fuerunt.

3.) Hæ.

- 1.) Hæmorrhagias impetuosiores, inprimis vero criticas, repenitè cohibitas, mox gravissimæ anxietates, imò Lipothymia, motus spasmodici, aut stupor, imò Paralysis partium consentientium excipiunt.

## IV. Remedia.

- 1.) VSio extra paroxysmum præservationis gratia, in paroxysmo revellendi intentione, admixtrata.
- 2.) Ligaturæ, Frictiones, aut quæcunque sensibiles alterationes repentinæ partium remotiorum, aut oppositarum.
- 3.) Nimiam sanguinis tenuitatem & agilitatem, temperantia, absorbentia, Emulsiones, & da lenia.
- 4.) Turgescentiam ejusdem moderantia: ☉ depuratum, Lap. Prunellæ &c.
- 5.) Antispastica: gina, Spec. & Confect. de Hyacinth. Smaragd. præparata.
- 6.) Tonico-Nervina: Sola Volat. Urinosa, præsertim cum Tinct. Alcalicæ, y. g. Tinct. Cri, vel gii. Quata solaciata.
- 7.) Sedativa. Anodyna: Semen Hyoscyami, MP. de Cy-noglossa &c.
- 8.) Adstringentia: Lapis Hæmatites, Corallia, cum & do exhibitæ, Crocus & ris subtilior, Solutio Oli. & ris ex minera Hassiaca ju Almantostha.
- 9.) Amuletica & Sympathetica: Busto exsiccatus, Pulvis sympatheticus Dygbæi, Lignum sympatheticum h. e. lignum fraxini circa solstitium æstivum ante solis ortum cæsum, Rad. papav. rheoad. ipso Festo D. Jo-hannis iustrumento aureo effossa, Sanguis proprius totus & exhibitus.

## V. Formule Remediorum ex. gr.

Pulvis Temperans D. D. Stahl.

R. Ocul. 69. Corall. rubr. præparat. aa. ꝑß.

B

Matr.

Matr. perl. præparat. Arcan. duplicat.  $\square$  Ori Olat. aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
Ori depurat. vel Lap. prunell.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 $\mathfrak{z}\text{is}$   $\mathfrak{z}\text{ij}$  vel nativ.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

M. div. in 6 partes æquales, quarum una singulis vel  
binis horis exhibeatur vid. Dissertat. de Hæmopt.  
 $\S. 30.$

Pulvis antispasmodicus.

$\mathfrak{R}$ . Ori Olati,  $\square$  depurat. aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
Conch. præparat.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 $\mathfrak{z}\text{is}$  optim.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
M. F. pulv. Dos.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Pulvis moderatè sistens.

$\mathfrak{R}$ . Pulv. Antispasmod.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
Spec. Hyacinth. gr. xvj.  
MP. de Cynoglossi. gr. iv.  
M. Div. in 4. part. æqual.  
D. S. Anhalten des Pulses gegen die Nacht eins oder  
zwei zu geben.

Mixtura Tonico-Nervina, sive Diuretico-  
Discutiens.

$\mathfrak{R}$ . Tinct. Ois Ori. vel Tinct Ori. Regul.  $\mathfrak{z}\text{ij}$  Mixtati.  
~ C. C. mediocriter dephlegmati, probe tamen re-  
sificati  $\mathfrak{z}\mathfrak{a}$ .  
M. Dos. gutt.  $\mathfrak{z}\text{ij}$  - 40. bis vel 3. de die, tam in ipso  
paroxysmo, quam extra eundem præservationis  
gratia.

#### VI. Methodus cædendi.

In omni hæmorrhagiâ attendere decet

- 1.) sanguinis quantitatem,
- 2.) crassum & motum ejusdem,
- 3.) intentionem Moventis.

\*) Sam.

\*) Sanguinis quantitati consulitur, partim etiam intentio-  
ni Moventis satisficit per VS. præservatoriam extra  
paroxysmum, aut fieri jam eruptioni sanguinis in  
paroxysmo aliquatenus indulgendo.

#### 1) Crassus sanguinis

- 1) tenuiorem corrigunt, Absorbentia, emulsiva, acidula.
- 2) Spissiores emendant, potus dilutior & simul mo-  
tus corporis proportionatus, Oia media digestiva,  
Antiscorbutica temperata.

#### Motus ejusdem

- a) turgescitorum cumpefcunt,  $\square$ , Acidalenia.
- b) congestorium præoccupant & revellunt, Hirudines,  
Pediluvia, Frictiones & Ligaturæ extremorum,  
Cucurbitulæ non scarificatae, tandem Tonico-Diu-  
retico-Discutiencia, Oia Alia cum Tinct. Alca-  
lica sociata.

\*) Exacerbationem ipsius Agentis seu principii vitalis de-  
mulcent Anodyna, Sedativa è gemmis, Analeptica,  
Amuletica. Externa vi quasi reprimunt terror tam  
moralis quam physicus.

2.) Extra paroxysmum itaque ejusdem recursus præ-  
occupandus VSne præservatoria, Temperantibus  
Odis, Tonico-Nervinis & Diuretico-Discutienci-  
bus, v.g. Mixtura è ~ CC. & Tinct. Ori; it. Diæta  
tenuiore, motibus corporis moderatis, evitacione  
causarum occasionalium, sanguinem fortiter & repen-  
te commoventium, imprimis Iræ & potus vini im-  
moderatoris.

3.) In paroxysmo Temperantibus, Divertentibus, De-  
mulcentibus, Tonics res gerenda, & non nisi sum-  
ma urgente necessitate ad Adstringentium usum con-  
sugendum.

B 2

3.) Post

3.) Post paroxysmum Analeptica, Tonica, Discutientia subjungenda.

VII. Cautela Practica.

- 1.) Hæmorrhagiæ non immodicæ, non nimium frequentes, in ætate adhuc juniore, præsentē sensibili plethorâ, causarum quoque occasionalium incitantis, de-  
mum ad eruptionem pertingentes, nullam sensibi-  
lem fatigationem, sed sublevationem potius post se  
trahentes, nequaquam suppressendæ, imo ne qui-  
dem curandæ sunt.
- 2.) Alterantia in hæmorrhagiis, sensibili plethorâ, aut  
assuesfactione subnixis, absque prægressu aut subjun-  
cta imminutione sanguinis ventilatoria nihil unquam  
soli aut constantis efficiunt, licet in præsens paro-  
xysmum compescant.
- 3.) Anodyna minus locum habent, ubi ab immateriali  
potius causa v. g. periodo temporis, Animi pathê-  
matibus, hæreditaria dispositione, consuetudine,  
quàm materiali aliquo incitamento, v. g. plethorâ  
evidente, potu æstuosiore, motu vehementiore, &c.  
Hæmorrhagiæ concitantur & exacerbantur.
- 4.) Fatiscientibus jam propter prægressam sanguinis enor-  
mem profusionem viribus, præstat anodynus abstinere,  
ne major inde virium defectio sequatur, & solis A-  
naleptici atq; Nervini non nimium acribus insistere.
- 5.) Amuletica & sympathetica, vel sub his planè mitis,  
vel sub declinatione, non in ætate seu summa exacer-  
batione adhibenda sunt.
- 6.) Amuletica ejusmodi præfentiorē effectum præstant  
in subjectis sensibilibus, & animi magis pensiva-  
bundi, qui vix expectandus est in iis, qui indolis  
torpidioris, aut turbulentioris, & impatientis sunt.

7.) Si

- 7.) Si Alia, præsertim largioribus dosibus exhibita,  
in subjectis habitu spongiosiore præditis, seu San-  
guineis, ubi Plethorâ concurrens per VSnem, aut  
ipsum fluxum sanguinis, nondum aliquatenus im-  
minuta, aut quando febris complicata est, præter  
alia incommoda, tumores œdematosos plerumque  
inducunt.
- 8.) Adstringentibus extra paroxysmum, ejusque recur-  
sum his ipsis intercipere & præoccupare velle, ple-  
rumque conamen irritum, quin periculosum est.  
Imo ne in ipso quidem paroxysmo ad ea confugien-  
dum est, nisi summa demum & urgente necessitate,  
Per sola adstringentia & nimium fluxus compescere,  
plerumque vanus conatus est.
- 9.) Exiguæ adstringentium doses fluxum sæpe augent,  
largiores verò, aut subjectis sensibilibus exhibi-  
tæ, fluxum plane supprimunt, & facile aliorum vi-  
scerum consipationes, & graviores læsiones indu-  
cunt.
- 10.) Nullibi verò minus efficiunt, quàm in Hæmorra-  
giis narium internè exhibita, extrinsecus verò na-  
ribus injecta, aut insufflata paulò præfentiorē effi-  
caciā exerunt.
- 11.) Circa Hæmorrhagiam Criticam notandum, quod  
paucum nihil sit criticum: paucitas enim hic indi-  
cat, agrum esse debilem & enervatum, Naturam  
movere quid, sed parum promovere.
- 12.) Talis hæmorrhagiâ sæpius à spumescencia sangui-  
nis oritur, unde agroti plethorici die 3. vel 5. refri-  
gerantibus tractandi sunt, ut nimia spumescencia  
occuratur. Cavendum vero sibi est ab usu Spiri-  
tus Suis in febribus, imprimis si pectus male se ha-  
beat, tussim enim exasperat, Urinam nimis stimu-  
lat, & facile obstructionem hepatis parit.

B 3

13.) Si



- 13.) Si vero Critica hæc hæmorrhagia nimis vehemens sit, internè leviter Adstringentia simulque Confortantia v. g. Corall. præparat. Spec. de Hyacinth. Smaragd. præparata, & si summa urgeat necessitas, Anodyna in refracta Dosi usurpari possunt.
- 14.) Externè verò nihil est tentandum, aliàs anxietates repentinae cooriantur, præter ligaturas & frictions, it.  $\forall$  camphoratum leniter crocatum, vertici & temporibus illitum.

### COROLLARIUM.

Circa *Hæmorrhagias* Vulnerum, siue à læsione externa oriundas, adeoque passivas magis, notanda sunt:

#### I. Differentia

- a.) Aliæ enim magis immediate è vasis capacioribus inprimis arteriosis dissectis; aliæ mediâtè magis è partibus porosis prorumpunt.
- b.) Aliæ nudo passivo effluxui ortum debent; aliæ cum activo simul appulsu & affluxu conjunctæ sunt: Illæ in vulnere recentiore, hæc in progressu demum circa quantum diem eveniunt.

#### II. Prognosis.

- 1.) Hæmorrhagiæ, quæ vulneribus corpori plethorico, aut homini, in ipso ebrietatis, vel excarescentiæ astu constituto, insiliētis superveniunt, si repenti & violenter per adstringentia & sanguinem coagulantia reprimantur, plerumque tumores & inflammationes partis læsæ, imò febres vulnerarias, interdum satis æstuosas, post se trahunt. aut majori cum impetu circa se iterum recrudescunt.
- 2.) Post immodicas plane sanguinis per partes vulneratas & vasa disiecta profusiones, universo corpori cachectica dispositio, vulneratæ verò parti insignis debilitas, tumor oedematofus, aut contra aridura imminet.

chectica dispositio, vulneratæ verò parti insignis debilitas, tumor oedematofus, aut contra aridura imminet.

- 3.) Homines plethorici, vinosi, iracundi, hæmorrhagias largas à vulneribus passis, plerumque anniversario tempore, vel circa ipsa loca affecta, vel circa loca hæmorrhagiis aliis dicata, plasticos, tumefcentes, inflammatorios, quin febriles affectus, qui alias evacuationes sanguinis consuetas suppressas sublequuntur, incurrunt, nisi vel actuali evacuatione artificiali, vel matura talium commotionum præoccupatione pharmaceutica iis occurratur.

#### III. Remedia.

- 1.) V.S. revulsoria, Compressiones & strictiones partium vulneratarum, aut ipsorum vasorum discessum Ligaturæ interceptoriæ, vel materiales obcuraciones;
- 2.) Vasorum discessorum majorum Cauterisatio:
- 3.) Partis vulneratæ, in recens læsati animalis adhuc calentis corpus, immersio:
- 4.) Sanguinem erumpentem coagulantia, partesque porosas constringentia & obcurantia: V.R.issimus,  $\phi\phi$ . Terebinth. æthereum, & da concentrata, Solutio  $\phi$ . Ch. Colcothar ejusdem, Medulla crepitus lupi, (vulgò Vossii) Farina volatilis, Pulvis ranarum exsiccatarum, & Albumen ovi siccatum & pulverisatum, Telæ araneæ &c.
- Ex compositis celebris est liquor stypticus Boudeti, cujus mentio sit in A. G. H. s. n. V. II. 41. it. 133. nec t. 07. Vol. II. Obs. 45. it. Liquor stypticus Soc. Regis Anglicæ in Officina Chymica Staphorstii descriptus, porro Liquor stypticus Weberi peculiari tractatulo,

Anchora Sanciatorum inscripto. commendatus, tandem Pulvis Ischæmus Hildani & Barbette.

IV. *Methodus* medendi cum cautelis practicis.

- 1.) Hæmorrhagiæ, ni præsentissimi periculi metus contrarium suadeat, quin urgeat, ab initio aliquatenus indulgeatur.
- 2.) Quodsi vero vas capacius arteriosum læsum, adeoque periculum in mora fuerit, quantocyus & quibuscunque remediis eadem reprimatur, sive interceptione & ligatura, sive cauterisatione, sive sanguinis erumpentis coagulatione.
- 3.) Quodsi hæmorrhagia ex arteria non plane discissa erumpens, pertinaciter quoque sæpius recrudescens alia subsidia eludat, transvertim penitus dissectetur, & extremitas superior cauterio tangatur.
- 4.) Tumor partis vulneratæ, aut Febris vulneraria, si epentrix sanguinis restrictioni superveniat, aut ipsa hæmorrhagia circa statum cum violentia insigni recrudescat: Vt Sone revulloria in parte opposita, internis antifebrilibus, & externis camphoratis opus est.
- 5.) Factæ nimix profusionis damnis per analeptica, diætam restaurantem, vini generosioris usum medicum, partisque læsæ, per nervino. balsamica externa roborationem, succurritur.
- 6.) In vulneribus circa juncturas & partes tendinosas, Bda pro sanguine sistendo non conveniunt; rectius officio suo tum fungetur o. Terebinth. æthereum &c.

TAB. IV.

TAB. IV.

DE

## CONGESTIONE.

*Congestionum* notanda sunt

I. *Definitio*: Congestiones sunt compressiones (convulsiones) activæ partium, mediante motu tonico, quibus sanguis, & cum hoc reliqui humores versus & in certa loca restringuntur & recipiuntur, copiosioris secretionis, vel hæmorrhagicæ perruptionis gratia. Vel adhuc brevius: Sunt restrictiones & detentiones sanguinis, versus & in illa loca, hæmorrhagiis destinata. Accidunt circa caput, nares, fauces, pectus, ventriculum, renes, intestinum rectum, & occurrunt circa ventriculum, sive circa venam portæ.

II. *Signa.*

- a) In parte affecta, occurrit hujus 1.) infarctus, 2.) inflammatio & distensio vasorum, ita ut exilissima visumque alias fugientia vascula, in conspectum prodeant. 3.) augmentum caloris & coloris naturalis, 4.) dolor quandoque gravativus, quandoque tendivus & pungitivus, artierum pulsui respondens, 5.) partis ita laborantis ad motum ineptitudo.
- b) In partibus remotioribus vero aut oppositis, occurrat spastica quedam strictura & aspectus quasi exsanguis & exsuccus, major etiam frigoris sensibilitas, aut æqualis harum partium refrigeratio.

III. *Effectus.*

- 1.) Generales: Congestionibus ejusmodi complicantur facile & succedunt tumores, dolores, inflammationes,

G

nes,

nes, ulcerationes manantes, stupores & debilitates paralytodes partium.

2.) Speciales & quidem

1) Congestionum ad caput: Cephalalgia cum rubore faciei, & inflatione vasorum circa tempora, Ophthalmia & dolores compundorii quasi in intimo medullio bulbi oculi, cum inflatione exilissimorum vasculorum sanguiferorum, imò actuali bulbi protuberantia, Oralgia, & Angina, Aphthae, affectus deliriosi & comatosi (quo in casu jam Antiquiores raptum humorum ad caput accularunt,) circa dies criticos, cum Urina tenui & pauca, Epilepsia juniorum cum vehementibus oculorum torsionibus, Apoplexia sanguinea, Vertigo, profundiori capitis ad terram inclinationi, aut pedum vel praecordiorum refrigerationi superveniens, memoriae debilitas.

2) Ad pectus: Angustia, respirationes oppletivae, Asthmata convulsiva periodica.

3) Circa hypochondria: dolores cardialgici, tensorii, lancinantes, vomibunda torsiones ventriculi, quin universa pathematum hypochondriaco-haemorrhoidalium scena, inprimis alvi non tam simplex siccitas, quam actualis strictura, sensibiliores tales exacerbationes vel antecedens, vel concomitans.

4) Ad renes & haemorrhoides: Varices crurum, variaeque nephritica, ichiadica & podagrica praeludia.

IV. Prognosis.

Quo magis hujus generis affectus assuefiant, eo promptius etiam, citra materialis, aut occasionalis causae veram proportionem, facile recrudescunt, crebrius

brius insulant, diutius continuant; imò veluti in jugem habitum transmigrant. Idque tanto certius, si diæta praepostera, animi turbulentis commotionibus, medicamentis & regiminibus calidioribus, intempestivo narcoticorum usu exacerbentur, aut perturbentur. Sanguinis ventilationes in ipso paroxysmo administratae, non raro in praesens sensibile quidem levamen afferunt, sed, restituta eadem sanguinis abundantia, tanto promptius affectus hi repullulant, tantoque pertinacius idem subsidium denuo exposcunt.

V. Remedia.

1.) Causam antecedentem, sanguinis nempe abundantiam, tollunt VS. & Scarificationes praeservatoriae, it. hirudinum applicatio congrua.

2.) Motus congestorios avocant, revellunt, divertunt pediluvia, frictiones, cucurbitulae non scarificatae, fonticuli, rubefacientia sive Sinapismi Veterum, Vesicatoria, Setacea, tandem alvi quoque cum aliquo stimulo expeditio per Clysteres vel Infusa laxantia.

3.) Aequalem universae massae humorum distributionem promovent blanda diaphoretica, diluentia, paulo largius calide hausta, v. g. Infusa Théae, Coffeae, Veronic. Salv. fl. Lavendulae, &c. ipsa quoque Alexipharmaca moderatis dosibus, & justis temporum opportunitatibus data.

4.) Nimiam sanguinis expansionem compescunt absorbentia, &c.

5.) Spasticam fibrarum stricturam demulcent aëria, v. g. Pulvis Antispasmodicus &c.

6.) Ipsius moventis exacerbationem demulcent anodyna, emulsiva, graviora analeptica, Specifica.



- 7.) Sanguinis congesti & restagnantis discussionem promouent externa Topica, v. g.  $\psi$  camphoratus, Epithema ex sem. carvi, bacc. juniperi, &c. communi & mica panis fermentati &c. his subordinata lenia repellentia ex Oo, Saccharo hni, &to rosaceo.
- 8.) Tonum partium roborant succinata, Sia Alia Urinosa, v. g. Ess. Succini cum Ess. lignorum, salassas, mixtura tonico-nervina ex  $\sim$  CC. &  $\text{öi}$  Tinct. vel Ois  $\text{Qri}$ .

#### VI. Methodus medendi.

- 1.) In paroxysmo ante omnia alvus expediatur per Clysterem, aut blndum aliquod laxans, subjungantur absorbentia, Dofa, Cinnabarina cum diaphoreticis fixis, imo, si dolorum atrocia, aut affectus vehementia postulat, potest his lene anodynum versus tempus somni adjungi. Subjungantur denique & interponantur Alexipharmaca temperata, adhibitis simul in subsidium externis topicis.
- 2.) Extra paroxysmum Ventilationes sanguinis præparatoriæ, circa Equinoctia instituantur, aliæ factæ jam constanter repetantur, neque temere negligantur, præmissis, interpositis, subordinatis pediluvii, laxantibus cum epirasi, fuccinatis, Oibus Aibus, concurrente simul conveniente rerum non naturalium usu, inprimis circa motum & potum sufficientem.

#### VII. Cautela Præctica.

- 1.) Ventilationes in ipsa affectus exacerbatione administratæ, non nisi præfenti paroxysmo subveniunt, rebus autem tranquillioribus adornatæ, magis in futurum quoque suam extendunt efficaciam.
- 2.) Anodyna, ut & Diaphoretica positiua, siue Alexiphar-

pharmaca non facile exhibeantur, nisi alvo prius expedita.

- 3.) Si copiosior subsit congestio, & corpus insuper spongiosius, vel suspicio obstructionis viscerum, abstinendum est in incremento & *deus* affectus, à Oibus Aibus, præsertim sæpius datis.
- 4.) In notabili vero declinatione, à paucis inprimis Dofibus incipientibus non male se gerunt.
- 5.) Durante adhuc restrictione reliquarum partium, adeoque nondum patente reditu è loco suæ restagnationis & libera distributione sanguinis, ad externa Topica discurrentia, vel repellentia non est properandum: exacerbantur enim inde tensiones & dolores potius, quam leniuntur.
- 6.) In omnibus congestionibus sanguinis ad superiores partes, ubi æstus febrilis abest, multum levaminis afferunt pediluvia, multum quoque confert in tali constitutione, pedes & præcordia densioribus integumentis à frigore præmunire.
- 7.) Pediluvia calidiora, præsertim, si altius pedes immergantur, aut nimis diu immergi debeantur, in corporibus valde plethoricis, alvi concurrente obstipatione, facile commotiones febriles exsuscitant.
- 8.) Vescicatoria magis in acutis, Fonticoli & setacea in chronicis humorum ad certas partes restrictionibus & decubitus locum habent.
- 9.) In pertinacibus Hypochondriaco-Ischiadico-Podagrico-Hæmorrhoidalibus congestionibus, peculiaris efficacæ sunt humidines orificio ant applicatæ, vel spontaneus & sufficiens hæmorrhoidum fluxus.

## AFFECTIBVS SPASTICO- ARTHRITICIS.

*Affectuum Spastico-Arthriticorum notanda veniunt*

I. *Differentia à congestionibus & commotionibus sanguinis hæmorrhagicis simplicioribus:*

- 1.) Hæ propius adhuc, illæ vero eminus magis excretiones sanguinis respiciunt & intendunt.
- 2.) Hæ magis ad interiores, illæ vero ad exteriores musculosas partes vergunt.
- 3.) Hæ breviori, illæ vero longiori duratione ut plurimum circumscribuntur.
- 4.) Hæ magis poros partis vel vasa sanguifera ipsa; illæ vero fibras potius musculares sigillatim tendere & affligere videntur.
- 5.) Hæ magis in inflammationes vel ulcerationes; illæ potius in rigores, contracturas, vel tabidas extenuationes partium pronæ sunt.

II. *Species diversæ.*

- 1.) Alii affectus sunt leviores, adeoque Arthritidis nomen nondum promereri vulgo crediti, sed sola Rheumatismum, dicitur sufficere / compellatione larvari soliti;
- 2.) Alii sunt graviore vel generalem Arthritidis denominationem jam apertius profitentes, vel prolocorum affectuum diversitate, diversis quoque nominibus insigniti. Sic in capite audiunt dolores Odontalgico-hemicranici; in thorace Pleuritidis spuria; in lumbis Nephritis spuria; in coxis Ischiadicum malum; in pedibus Podagra; in manibus Chiragra.

III. *Si.*

III. *Signa.*

- 1.) Dolor quandoque tensivus, liberis artus istius, quem occupat, motibus impedimentum solummodo afferens, & nonnisi sub conatu movendi evidentiùs emicans;
- 2.) Quandoque conatus magis lancinans & fibratilis, sub levi etiam motitatione membri, velut rupturæ periculum afferens;
- 3.) Non tamen jugiter æqualis, sed per vices remittens, quin interdum intermittens;
- 4.) Sæpe sine rubore & tumore notabili;
- 5.) Qui, si accedat, dolorum sensibilem mitigationem plerumque afferens;
- 6.) Urina Sedimentum quæ post refrigerationem in fundo deponens, & lateribus vasibus affigens; quod proinde à sabulo calculosorum probe discernendum, quippe quod statim cum Urina emittitur, & mox in fundo colligitur, nec lateribus adhærescit.

IV. *Subjectum.* Affectus hi familiares sunt personis

- 1.) habitus spongiosioris, sive de Temperamento sanguineo participantibus;
- 2.) Evacuaciones sanguinis naturales, vel artificiales expertis, aut certe promeritis;
- 3.) Indolis animi iracundæ, diætæ lautæ vinosæ, Veneri deditis;
- 4.) Etatis non plane juvenilis, sed consistentioris, quin jam ad senium tendentis;
- 6.) Parentibus arthriticis, nephriticis, calculosis, podagricis, hæmorrhoidariis prognatis.

V. *Prognosis.*

- 1.) Leniores etiam horum affectuum species, si sæpius recurrunt, non minus in consuetudinem abeunt, quam

quàm graves, imo successu temporis facile in graves & fixiores arthriticos dolores degenerant.

- 2.) VS. in ipso paroxysmo instituta, sine subjuncto debito regimine modeste diaphoretico, aut justo parciore, non raro commotiones febriles exsuscitant.

#### VI. Remedia.

- 1.) Causæ antecedenti, sc. sanguinis abundantia propiciunt ventilationes sanguinis, partim per promotionem excretionum naturalium, Mensium & Hæmorrhoidum; partim per vicarias evacuationes artificiales, VSes & Scarificationes, quin & hirudines.
- 2.) Orgasum & tenuitatem sanguinis Sino. & rei, corrigunt Absorbentia, Mosa. emulsiva.
- 3.) Spasticam fibrarum tensionem leniunt Cinnabarina.
- 4.) Æqualem humorum distributionem promovent Diaphoretica sive Diaphoretica temperata.
- 5.) Motus exacerbationem
  - a) leniunt Anodyna & Specifica,
  - b) revellunt Externe Diuretica, v. g. Oia Aliacum Ois Pri Tinct.
- 7.) Externe dissolvunt eandem Discutientia, v. g. V Camphoratus, ~ formicarum. Empl. Sapon. Barbette: In phlegmaticis Ceratum de Galbano, Sacculi ex suffuribus triticeis & Oe tosto, Suffitus ex flor. Stechados citrin. HB. Sabina, Thure, Mastiche &c. frictions cum pannis mollioribus calentibus, vel excutia molliore: Motus voluntarii exercitium studio intensum, & quæcunque sensum vel in parte affecta, vel conjugata fortius aut constantius alterant v. g. Acupunctura Japonenf. Moxa Chinenf. Vesicatoria, Scarificationes profundiores in parte immediate affecta.

VII. Me-

#### VII. Methodus medendi.

- 1.) Extra paroxysmum VSes præservatoriae circa Æquinoctia, Scarificationes circa Novilunium in parte affecta, vel ejusdem confiniis: it. blandæ primarum viarum per leniora catarctica, aut mitiora quoque emetica evacuationes.
- 2.) In paroxysmo:
  - a) Internè temperantia, & æqualem humorum distributionem promoventia, h. e. Pulvis antispasmodicus ter vel quater de die exhibitus, cui, si dolorum ferocia id exigat, versus tempus somni lene anodynum addi potest. Præmissis temperantibus subjungi & interponi possunt temperata Alexipharmaca;
  - b) Externè V Camphoratus, vel solus, mediantibus linteis multiplicatis, parti dolenti impostis, ac singulis binis, vel ternis horis renovandis, vel etiam cum Empl. Saponat. Barbette alternatim applicitus.
- 3.) In declinatione:
  - a) Internè Mixtura tonico-nervina ex Tinct. Ois Pri & ~ CC. vel Liquore CC. succinat.
  - b) Externè ~ formicarum.

#### VIII. Cautela Practicæ.

- 1.) In ipso paroxysmo præstat à sanguinis ventilatione, si fieri possit, abstinere, plus valet præservatoria præoccupatio.
- 2.) Sanguinis evacuationes in ipso paroxysmo institutæ imprimis per VSnem, plerumque augent pertinaciam affectus, ut in posterum non solum tanto promptius recurat, & tanto obstinatus recrudescat; sed &

D

tail-



- tanto obstinatius aliis remediis non cedat, verum potius idem subsidii genus denuo efflagret.
- 3.) Neque etiam illæ ipsæ in paroxysmo administratæ semper debitum effectum assequuntur, nisi vel circa prima initia, vel circa declinationem denuo adorientur.
  - 4.) Plus fere semper utilitatis habere videntur, in corporibus non nimium plethoricis, sanguinis evacuationes ex parte immediate affectæ, aut conjugata per scarificationem, profundiores incisionem, hirudinum applicationem.
  - 5.) Alvo sua semper constet libertas, fortioribus tamen purgantibus in ipso paroxysmo eandem irritare minime expedit: His ipsis enim facile motus spastici ab exterioribus ad interiora revocantur, non sine vitæ discrimine.
  - 6.) Repellentia fortiora simili ratione malum ab exterioribus ad interiora retroagunt, & gravissimas respirandi angustias, quin febres inflammatorias ut plurimum funestas inducunt.
  - 7.) Narcotica & refrigerantia externe adhibita, stuporem, tephos & nodos, quin contracturam parti dolenti plerumque conciliant.
  - 8.) ~ Urinosi pariter stupidum rigorem parti laboranti affricant.
  - 9.) ☉. Qta v. g. Succini, Juniperi, Petroleum &c. ~ quoque ☿. si, Balsamo Peruviano, aliisque sic dictis nervinis, largius imbuti, sensum ardoris, rorionis, totiusque mali ferociam exasperant, siquidem partes affectæ non tam debilitate aliqua, quam potius nimia activitate laborare videntur.
  - 10.) In doloribus arthriticis magis obfirmatis & inveterascen-

rascentibus, imo in spasticum rigorem & contracturas jam vergentibus, commodum sæpe auxilium & levamen offert ~ formicarum.

11.) In malo vero recentiore adhuc, ubi sensus urens & lancinans vehementius adhuc affligit, dolores potius exacerbare videtur.

12.) Qui spasmodicis motibus & doloribus afficiuntur, his conducunt quidem Alexipharmaca, sive Bezoardica vel sudorifica, abesse tamen debet regimen sudorificum, alias dolores facile in omnes artus se diffundunt. Post usum sudoriferorum per 3. vel 4. dies continuatum usurpari possunt lenia anodyna, ut MP. de Cynoglossi: ad gr. i. vel ii.

Optime quoque conferunt Vina laxantia, inprimis ex Helleboro nigro, qui in consumptione sanguinis singulares effectus præstare dicitur.

#### TAB. VI.

#### DE

### MOTIBUS CONVULSIVIS.

*Convulsionum*, Motuum convulsivorum, & quæ horum summi premus veluti gradus est, *Epilepsie* notanda sunt

#### I. Signa, & quidem

- 1.) Convulsionis, sive spasmi simplicis completi: partis alias mobilis obrigescentia, sive rigida membri tensio, ita, ut nec voluntatis propriæ imperio, nec partium reliquarum sanarum ministerio, nec adstantium auxilio, sine violentia & dolore sisti queat. Tatis violenta torsio oris dicitur Spasmus cynicus.
- 2.) Motuum convulsivorum: reciproca partis alicujus,

Q 2

vel

vel totius corporis agitationes præter voluntatem imo sæpe citra reminiscientiam contingentes.

### [ 3.) Epilepsia

- a.) *signis prodromi sunt* 1.) Scintillarum oculis obversantium apparatus, 2.) auræ frigida ex parte aliqua à capite remota ascendens sensus, & 3.) clamor & vociferatio:
- ß.) *præsentis symptomata sunt* 1.) casus repentinus, 2.) sensuum abolitio, 3.) torsiones oculorum & labiorum, 4.) jactationes artuum, quin non raro totius corporis, violentæ, 5.) spuma circa os, 6.) pollicum in manus retractio, 7.) Urinæ, vel feminis involuntaria emissio:
- 7.) *factæ confectaria sunt* 1.) vertiginosa perturbatio capitis, 2.) lassitudo totius corporis, 3.) Sudor graveolens, vel huius ad minimum olidus, 4.) Sitis.

### II. Species

Motus convulsivi sunt

- a.) vel Symptomatici, qui morbis aliis, præsertim vero acutis laboriosis succedentibus superveniunt;
- ß.) vel Idiopathici, qui citra morbos alios, per periodos affligunt, & strictiori Epilepsiæ appellatione insigniri solent.
- 1.) Alii causas materiales pro fundamento aut fomento agnoscunt, v. g. cruditates primarum viarum, vermes, crustam lacteam, achores, aliasque ulcerationes scabiosas, præsertim circa caput retropulsas. Quæ suppressa, semen retentum, graviores contusiones, & profundiores puncturas nervosarum & tendinosarum partium.
- 2.) Alii causam magis immaterialem respiciunt, v. g. hereditariam dispositionem, commotiones animi

tur;

turbulentiores, præcipue iram, terrorem, amorem vesanum, impressiones ideales per veneficia & philtrea, periodos temporis, phases Lunæ &c.

- 3.) Alii servant adhuc aliquam cum causarum prædictarum præsentia & energia proportionem.
- 4.) Alii, neglectis his incitantibus materialibus & occasionalibus, in frivolum quasi assuetudinem & proterviam degenerarunt.

### III. Subjctum.

- 1.) Morbis convulsivis familiarius expositi sunt infantes magis, quàm adulti, femina quàm mares.
- 2.) Facilius quoque iisdem obnoxii sunt infantes succulenti, (volubrig) indolis iracundæ, aut qui parentibus, inprimis vero matre, & quidem præcipue gestationis tempore ira ac terroribus frequentius expositi, prognati sunt.

### IV. Prognosis.

- 1.) A convulsionibus, sive spasmis, ad motus convulsivos facile est transitus, & ab his ad illas familiaris veluti receptus.
- 2.) Motus convulsivi symptomatici in Acutis semper periculosi, magis tamen circa statum & dies criticos, quàm in initio, aut incremento, periculosiores quoque in adultis, quàm infantibus, in maribus, quàm feminis.
- 3.) Epilepsia quæ à plagis, aliisque doloribus, v. g. dentitione difficili ortum ducit, & postmodum superato, vel curato isto affectu, remittit, non facile recurrit;
- 4.) Quæ aptem per animi pathemata graviora concitata sunt, facillime recrudescit.
- 5.) Epilepsia habitualis, quantumconque diris symptomatibus stipata, per se vix levis est.
- 6.) Epilepsia, quæ in maribus ante pubertatis annos, in

sceminis ante strui sanguinis (mensum) eruptionem evenit, sæpe circa insigniores has totius œconomix animalis mutationes remittit.

- 7.) Epilepsia, ut & aliæ generis nervosi ataxiæ sceminis circa ælium eruptionem obvenientes. & post horum expeditionem ac debitum successum cessantes, facile tamen imprægnationis, gestationis a. puerperii tempore recurrunt.
- 8.) Insultus epileptici, qui febrilibus infantum affectibus superveniunt, circa tempus debitæ potius declinationis cum febre hac usque valde vehementi, viribus admodum languentibus. & quibuscunque reliquis malis signis, ordinarie lethales sunt.
- 9.) Quodsi puerum febricitantem, variolas nondum perpassum, motus convulsivi invadant, cum ardore circa lumbos, postero die variolarum eruptio expectanda. Bagliv. Præx. pag. 79.

#### V. Remedia.

a) Causas materiales respiciunt, & quidem

- 1.) cruditates primarum viarum: & hii oraturum tene-rius, Panacea glis Glauberi, ☉ fulminans. & dulc. Hellebor. niger, Colocynthis: (in fortioribus sub-jectis)
- 2.) Vermes: Galia e.g. & d. cum gio diaphoretico. myr-rhata, colocynthiaca, Tinct. Grææ & Dres cœ-ruleæ, Æthiops mineralis.
- 3.) Flatus: Clysters, ☉ fulminans.
- 4.) Recrementa biliosa acria intestinorum: Cry stallus montana præparata.
- 5.) Dystrasiam Lymphæ: Absorbentia, & diaphoret. flor. & Succin. præparatum, ejusque Ess. ut & alia anticatarrhalia, imprimis Rad. Valerianæ.
- 6.) Spermatis abundantiam & orgasmum: ☉.

7.) San-

7.) Sanguinis excretiones supprellas: ventilationes ejusdem artificiales, & strui fluxus revocatio, vel promotio.

8.) Scabiem vel alias efflorescentias ulcerosas retro pul-sas: & dulc, fl. Aris, & supra laudata anticatarrhalia.

#### β) Motus

1.) exacerbatos & anomalos generatim demulcent A-naleptica, ex fl. Tilia, Poconia, fructu Ceraforum nigrorum, aliisque odoriferis gravioribus, unde tot ☉ antepileptici, Cinnabarina, Succinata, in Catarrhalibus scil. Stia Alia, partes animalium du-ræ præparata, Margar. præparat. &c.

2.) In consuetudinem & habitum jam deductos com-pestunt Specifica, ex quibus ab antiquioribus jam temporibus celebrari fuere solita Rad. & Sem. Pæon. maris (mit der einfachen Blüthe) stercus Pavonis & Leonis, Viscus quernus & corylinus, Ungula Alcis, anaghd. gt oder ge-schabt/ carbo Artemisiæ, Secundina humana (pri-miparæ sc.) Cranium human., Cerebrum corvi, Hippomanes, sive massa glandulosa in ore pulli equini recens nati repertiunda, vulgò die Miltz dicta.

Recentiorum suffragia & encomia meruere Lum-brici Vistres, Corda & Hepata Talparum ac Rana-rum, imprimis viridum, Ser Laub & d. / Spi-na lacertarum, in acervo formicarum exesatum, Os triquetrum cranii humani, vel suilli, Os semi-lunare carptionum, ~ sanguinis humani, (in Epil-lysterica) die w. iss. n. Sedit. aus den Kr. & Sæe-zen. Plebeja experientia commendantur Malleus & Incus ex cranio vitulino, habito simul respec-tu ad diversitatem sexus, desumpti, Bilis canis atri recens

recens dissecti cum pulvere unicornu fossilis subacta, Stercus Gallinæ ova incumbantis albidum &c.

# VI. Formule Remediorum.

## 1.) R. Cord. Talpar. exsiccat. no. IV.

Cran. human.

Talorum leporum,

Lumbricor. Vivum aa. ʒj.

Ungulæ Alcis præparatæ.

Cortic. Viscî quern. aa. ʒʒ.

M. F. pulv. Dos. pro Adulto gr. xv. ante paroxysmum exhibenda, cum somni, etiamsi non parum urgentis, interpellatione. Es hilff! wann die Patienten nach dessen Gebrauch einen Schweiß an der Stirne mercken.

## 2.) R. Bilis Canin. atr. quantum ex cane mediocri haberi potest, M. c. unicornu fossilis ʒʒ

F. P., dividatur in 4. doses, quarum una ante insultum, & reliquæ postmodum successivè exhibendæ.

## 3.) R. Auri fulmin. gr. i.

Arcani dupl. gr. V.

M. pro Dosi, infanti annum nondum supergresso propinanda. (in Epil. Symptomatica)

# VII. Methodus medendi cum cautelis Practicis.

## 1.) Universalia semper præmittantur Specificis.

2.) Ubi materialis causa subest, hujus correctioni, vel sublationi ante omnia animus intendatur; adeoque in motibus epilepticis, qui à cruditatibus primarum viarum, vermibus, crusta lactea, achoribus, vel scabie retropulsis, &c. bus, dependent, l. c. his collidunt, primarum viarum evacuatio, etiam paulo fortior, aut repetita, reliquæ curæ præmittantur, vel inter-

po-

ponatur. Quin & in habituali Epilepsia, quæ prope speciosa deponit, semper horum usus lenis præmittitur, ut earum exoneratio præmittatur, & reliquæ ex retentione in justo successu serventur.

3.) Nunquam vero, neglectis materiis, ad motus saltem solidandos dirigatur intentio; neque etiam materias fermentibus, præsertim medicamentis aggredi temeretur, ubi nullæ tales præsto sunt.

4.) Motus convulsi symptomati febribus supervenientes, directe non oppugnentur, utrimis per Opia, sed rel quæ potius febris decursus & successus legitimus omni modo promoveatur, poterunt tunc v. diaphoreticæ, Emulsiones, Cinnabarina sufficere.

5.) Cinnabarina in Epilepsia habituali oppidò parvæ sunt efficaciæ; plus præstant in motibus convulsivis symptomatibus, & spasticis restrictionibus ac congestionibus circa caput.

6.) Violentæ ereptiones pollicum, aliæque interpellationes paroxysmorum per odoramenta penetrantiora, insignem post paroxysmum defatigationem, aut promptiorem & frequentiorum ejusdem recursum causari solent.



## FEBRIBUS.

*Febrim notanda sunt*

I. *Definitio:*

Febris est complexus motuum, ut plurimum ordine fibi succedentium, secretoriorum & excretoriorum, præter gradum naturalem, seu tenorem consuetum, auctorum & intensum, ad noxam aliquam extraordinariam & fonticam corpori, imprimis vero sanguini imminuentem, vel jam inhaerentem, præoccupandam, aut tollendam.

II. *Species.*

1.) Ratione durationis & decursus, Febres sunt vel

- a) Acutæ, e.g. Petechiales, Pleuritica, Febris Castrensis, Variolæ & Morbilli; vel
- b) Chronicæ, v.g. Intermitentes, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, it. Lentæ & Hæcicæ.

2.) Ratione Typi Febres sunt

- a) Continentes, quæ nec intermittunt, nec remittunt, ut Synochus simplex, & putrida, Ephemera simplex, & plurium dierum.
- b) Continuae, quæ statas exacerbationes & remissiones, nunquam tamen plenariam intermissionem habent, ut Febres Catarrhales & Petechiales, quæ circa vespèram exacerbantur, horis matutinis vero mitius affigunt.
- c) Intermitteutes, quæ sensibilia intervalla vacua habent,

dent, ita, ut æger ad orthostadium redeat, v.g. Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ legittimæ.

3.) Ratione causæ, aliæ dicuntur

- 1.) Inflammatoriæ, quæ inflammationibus internis, vel externis gravioribus superveniunt, ut Pleuritis, Parapleuritis, Vulnerariæ.
  - 2.) Lochiales, quæ Lochiis suppressis superveniunt.
  - 3.) Lactæ, quæ impedimento lactis in mammis ingressum comitantur.
  - 4.) Biliosæ, quæ iracundiæ bilisque effusioni & regurgitationi superveniunt.
  - 5.) Sanguinæ, quæ sanguinis abundantis consumptionem & imminutionem intendunt.
- 4.) Ratione Symptomatum, aliæ sunt
- a) Erythmaticæ, quæ notabiles efflorescentias in superficie corporis formant, ut Petechiales, Purpuræ, Scorbuticæ, Febres erythelatoses, Scarlatinæ, Variolæ, Morbilli, it. Nessel: Eucht / das Rôtheln u.
  - b) Catarrhales, quæ Gravidinam, Coryzam, Tussim comites habent, aut subsequuntur.
  - c) Legitimæ, quæ consuetis anni & diei temporibus invadunt, solitis symptomatibus stipantur, & solito tempore ac more finiuntur.
  - d) Anomalæ, sive Nothæ, quæ ab hac norma defleunt.
  - e) Simples, quæ nulli alteri complicatæ sunt.
  - f) Compositæ, ubi continua cum intermittente concurrunt, aut intermittens duplicatur, v.g. Quotidianæ, Tertianæ &c. Continua, vel duplex.

5.) Ratione moris sive indolis, sunt

- a) Benignæ, quæ raro interrimunt, aut læsiones gravio-

viores post se relinquunt, ut Tertianæ legitima, Ephemeræ simplex, Catarrhales simplices.

6) Malignæ, quæ ut plurimum exitum afferunt, aut noxas fonticas & fere immedicabiles post se trahunt, ut Febres inflammatoriæ internæ, imprimis vero excretionibus externis arthriticis, vel erysipelaceis retropulsis supervenientes, i.e. Epidemicæ pleræque.

7) Pestilentes, quæ plurimos eorum, quos prehendunt, interimunt, & quidem præcipiti admodum progressu, communiter vel cum eruptione Bubonum, vel Anthracum, oder Carbuncul.

8) Ratione ortus & grassationis, aliæ sunt

1.) Epidemicæ, quæ ex communi aëris, vel  $\nabla$ æ vitio prognascuntur, & facile per Contagium propagantur, quales plerumque sunt Ecthmaticæ & Catarrhales, e.g. Febris scarlatina, Morbilli, Variolæ;

2.) Sporadicæ, quæ ex individuali in diætâ, vel Animi pathematibus commisso errore Patientem invadunt, ut Tertianæ vel Quartanæ, à nausea vel cibo dyspepto oborta, Febris ardens ab ira suscitata, Febris Lochialis à Lochiis resistantibus, Febris inflammatoria ab haustu frigido, corpore æstuante.

### III. Subiectum.

1.) Febres non certæ ætati propriæ sunt, sed in omnes sine discrimine sexus & ætatis grassantur.

2.) Febribus facilius obnoxii sunt personæ temperamenti sanguinei, vel cholericæ, status plethorici, evacuationibus sanguinis, vel aliis excretionibus statim alic.

assuetæ, indolis animi activioris, iracundæ, impatientis.

3.) Infantes non facile Intermitteutibus infestantur, sed, si febricitant, acutis plerumque corripuntur.

### IV. Signa pathognomonica.

1.) Magis essentialia sunt

1.) Pulsus frequens & celer,

2.) frigoris & caloris vicissitudo citra notabilem causam externam, &

3.) Urinæ, quoad consistentiam, calorem & diaphaneitatem mutatio.

2.) Consecutiva sunt

1.) Pallor & Rubor, subsidencia & turgescencia habitus corporis alternantes, citra causam aliquam occasionalem.

2.) Remissio ab aliis actibus vitalibus, ciborum nempe appetitu & digestionem, nec non rationalibus, h. e. Wann die Patienten verträglich und nicht disponiren sind zu ihrem Vorhaben / Esel haben verträglich / i. e. bursig und unruhig sind.

3.) Sins.

4.) Insolita animi sollicitudo, indeque corporis inquietudo.

5.) Somni neglectus, Schläfflose Nächte.

6.) Prostratio virium.

### V. Prognosis.

1.) Febris, h. e. motuum secretoriorum & excretoriorum præter gradum consuetum ad auctorem intentio, semper est salutaria, eventus tamen non raro præsertim in acutis, anceps est, imo letalis.

2.) Febres sibi relictae tranquillius & tolerabilius ad exitum

tum vel salutarem vel lethalem quoque decurrunt, quam variis artificijs interpellata.

- 3.) Febres sibi relictae, continente ac modesto regimine saltem adjunctae, statas excretiones aut mutationes criticas constantius & certius observant, quam quae medicamentis & regimine calidiore extumulatae, aut nimis absorbentibus suppressae, aut opiatas turbatae fuerunt.
- 4.) Plures ex febris convalescunt sola quiete & abstinentia.
- 5.) Difficillime restituntur febres corruptae, h. e. turbatae, violenter oppressae, & hinc recidivantes, it. in lentum atque anomalum typum praecipitatae.
- 6.) In omni febre, quae alias statas mutationes, vel Ecristes ferre solet, si haec non succedunt, sequitur periculum.
- 7.) Nulla unquam febris restituitur sine omni sudore, aut mutatione Urinae.
- 8.) In nulla febre sudor fluit sub *artificijs* aestus, sed quando hujus impetus remittit, si secus, symptomatikus est, inutilis, imo noxius.
- 9.) In omni febre acuta, si Urinae nihil mutantur, aut mutatas crudae sequantur, calamitosum est.
- 10.) Omnis febris in alterius tempora, habitus, aetates, opportunitates incidens, vel in illam degenerat vel in ejus mores anomalizat. Alias enim Synochi ante crepusculum, circa Solstitium; Biliosae circa ortum solis post Solstitium; Catarrhales, vespertino tempore circa Aequinoctia, invadere solent. Tertianae horas antemeridianas & tempus Vernum observant, aetati adolescentili & virili familiares sunt. Qua.

Quartanae horis pomeridianis, Autumno, aetati proveciori & naturis segnioribus obtingunt.

## VI. Remedia sunt

### 1.) Alterantia, eaque

- 1.) Absorbentia, ex quibus seliguntur, praecipue Ostracodermata, sive Conchylia, v. g. La. 59. Concha, Mat. perl. preparatae: exclusis Subadstringentibus, Bolariis, Cervinis, v. g. 7 Sigill. CC. uso, CC. f. Δe vel Philosophorum preparato, imo Coralliis quoque.
- 2.) Mucositatem humorum incidentia & vias abstergentia, sive enixa aut Digestiva, ex quibus praecipue Olco parata, ut ☐ Glat. Arcan. dupl. ☐ diatum, it. ☐ ea, ut Arcanum ☐ ri, Solutio Oc. 69. c. vino vel succo Citri: exclusis ē ☐ e communi desumptis, e. g. ☐ e digestivo Sylvii.
- 3.) Aestum temperantia & acrimoniam biliosam mitigantia, qualia sunt
  - a.) Nitrosa, e. g. Crystalli Ori, sive ☐ depuratum, Lap. Prunellae, sive ☐ tabulatum &c.
  - b.) Acida, e. g. Succus Citri, Berberum, Ribium, it. ☐ li, ☐ li, ☐ li, Clysus ☐ li, Tinā. Florum Bellid. Papav. rhoad. &c. exclusis ☐ bus ☐ dis dulcificatis, it. ☐ u ☐ is & ☐ u ☐ li philosophico, ob vim nimirum nimis diureticam & tussim facile irritantem.
- 4.) Diluentia, secretiones & excretiones copiosius instituendas promoventia: Potus tenuior & sufficiens, vel ce-revisiarius, vel Decoctum Hordei, aut CC. vel Infusum Thée, Coffe, aliarumque herbarum, florum aut radicum temperatiorum, neque

que adeo fastidiosarum, e.g. Rad. Scorzoneræ fl. Galeg. Herb. Meliss. &c.

- 5.) Analeptica, e.g. Emulsionēs amygdalarū s. filicines edulcoratæ, Portiones ex Vis odoriferis gratioribus, Vinum modicè & modicè sumptum, præsertim in assuetis.

## II.) Evacuantiæ, & quidem

- 1.) *Cuilibet febrī commoda*, quin necessaria,

a) Diaphoretica, v. g. ḡ diaph. recte præparatum. Væ diapnoicæ non ingrata, fl. Samb. Cardui bened. Scord. Galeg. &c.

b) Alexipharmaco-diuretica, v. g. Eff. ex Radd. Alexipharmacis temperatioribus & Scordio parata, Mixture simplex parcius camphorata, excluso usu copiosiore Camphoræ, Myrrhæ, rejectis itidem ~ibus Urinosis, v. g. ~u CC. ~u Fuliginis, ~u Bezoard. Bussi; nec non principalioribus sic dictis Bezoardicis, incondita farragine herbarum & radicū pulverisatarum, quin & Vis variis sigillatis adstringentibus suffractis, v. g. Pulv. Bezoard. Sennerti, Saxonico, Schneebergico, odoratū granatū sieben und siedentiger Pulver.

c) Successum alvi promoventia, non tamen positive stimulantia & irritantia, ut Clysteres siue Enemata,

- 2.) *Certo statui morbi, vel individuali circumstantiæ debita*

1.) Vomitoria, in principio Contagiosarum, it. in Intermittentibus, die vacuo, subjectis evemetis, quin actu vomiturientibus exhibenda.

2.) Purgantia, post declinationem Acutarum, it. in Intermittentibus lentescentibus, vel per adstringen-

gen-

gentia suppressis, itidem diebus Intercalaribus exhibenda.

3.) VS. iterata in subjectis plethoricis, assuetis, valde æstuantibus, insigni præcordiorum angustia oppletiva gravatis, antequam signa coctionis in Urina appareant.

3.) *Specificæ*, qualia à Kergero, Riverio, Apino laudantur, sed potius optanda quam speranda sunt.

## VII. Methodus medendi, varians pro diversitate

- 1.) *Status morbi.*

a) In primo principio interdum Vomitorium, VS. quandoque etiam Sudoriferum cum regimine datum, locum habet.

b) In incremento Temperantia, Absorbentia, Diurentia, parcius verò Alexipharmaca usurpanda.

c) In statu & circa dies criticos his ipsis insistendum, interponenda interdum Analeptica, præsertim ubi vigor Naturæ senescere videtur, quo in casu etiam Alexipharmaca magis opus sunt.

d) In declinatione, licet morbi impetus remiserit, & æger in portu jam navigare videatur, Alexipharmacorum tamen usus, & calor conclavis temperatus nunquam negligatur.

- 2.) *Paroxysmi.*

1.) Ante paroxysmum & sub paroxysmis vegetioribus sola Temperantia, Absorbentia, Abstergentia locum habent; Alexipharmaca verò & quasque excretiones stimulantia exulent, uti & Analeptica, quæ commodius post paroxysmum dantur.

2) Sub declinatione paroxysmi & tempore intercalari

F

lari



Iari Alexipharmacis, ac, pro re nata, Analeptici  
agendum.

### VIII. Cautela Practicæ.

- 1.) Febris in se, h. e. motus secretorii & excretorii ultra gradum consuetum intensi non debent curari, i. e. tolli aut suppressi; *Causa* vero sive materia, propter quam & contra quam Febris coorta est, curanda, i. e. corrigenda, vel expellenda est.
- 2.) Id vero vix potest simul ac semel fieri; sed opus est iusta mensura, & opportunitate temporis, quæ materia excernenda prius præparanda & separanda, quam evacuanda est.
- 3.) Hinc Medicus ante omnia secretioni æcessarium tempus indulgeat, & quicquid illam ipsam facilitari potest, contribuat: ubi excretionem subjungenda oportunitas succedit, illa quoque placide foveatur, si non semper medicamentis, continente tamen & tranquillo regimine.
- 4.) Tranquilla patientis continentia omnes excretiones faciliat, iniqua jectatio aut exasperat, aut turbat easdem, præcipue vero sudorem sensibilibus cohibet.
- 5.) Retardationes vero Sudoris, tempore debito sponte erupturi, & omni opera, placide tamen promovendi & proseguendi, augent tensivam & gravativam lassitudinem artuum, protrahunt & foveant morbi durationem, & in lentas febres typicas transferunt.
- 6.) Præmaturum tamen regimen diaphoreticum, vel etiam Diaphoretica positiva versus, vel inter paroxysmum data, æstum inutiliter augent, symptomata exasperant, motus Naturæ ordinatos confundunt.
- 7.) In omni febre evacuationes artificiales, præpostero tem-

tempore institutæ, vel nimium effectum præstant, vel aliam vel utrumque.

- 8.) In omni febre potulenta congrua, sufficienter concessa, reficiunt patientem, minuunt æstum, promovent quietem, & sudores debitos faciunt.
- 9.) Porus esto dilutus, non inebriativus, faculentus, neque actu frigidus, neque nimis haustibus ingurgitetur.
- 10.) In febre omni refrigeratio corporis voluntaria, aut accidentalis insignis, noxia est.
- 11.) In omni febre regimen iusto calidius vel per medicamenta, vel per integumenta, vel per nimiam concalescentiam conclavis, ægrum præter modum debilitat, efflorescentias cutaneas aut parit, aut præmaturat, & nimis copiose expellit, neque, deprehenso etiam errore, sine periculo statim mutari, nedum abrumpi potest.
- 12.) Sopitiones & cohibitiones motuum febrilium per Narcotica, præcipue in ipso vigore paroxysmorum pervertunt legitimum febris successum, vires prosterunt, mentem turbant, excretiones cohibent, aut novis anomalis commotionibus ansam præbent.
- 13.) Itaque symptomata febrium essentialium intrepide spectanda; Appetitus dejectio, præsertim in Acutis, parum curanda; Sitis, quantum sine immodestia fieri potest, largiter sublevanda; Vigiliæ nihil æstimanda; Inquietudines, à morali ægrotantis impatentia dependentes, ferils dehortationibus prohibenda; Vires interim judiciose Analepti fovenda sunt.
- 14.) Nunquam nimium tribuatur nudæ materiæ febrilis correctioni, magis intendatur matura ejus secretio atque excretio.
- 15.) Materia non moveatur, nisi sit mobilis, viæ prædispositæ, & Natura ipsa ad hujus emotionem pronâ.

- 16.) Si ullibi, in febris certe obtinet: In tempore venire, primum est.
- 17.) Salia Alia in Acutis largius, & diutius adhibita, facile tumores pedum oedematosos, imo hydropicos affectus post se trahunt, potius ☐. Platus exhibeatur.
- 18.) Acida temperata, v.g. ~ Oli, Clyſtus ꝑi, Aciditas Citri & Berberum eximium ſitis & n. mib ætus ſolatio afferunt: modo Tuſſis non obſtet, quæ tamen ab ædo Citri non tam facile, quam a reliquis exasperatur.
- 19.) Acida illa ſibi relicta præſtat ita pura adhibere, quam per ☐ dulcificata: emergit enim inde plane nova Craſis adhuc incognita efficaciæ; ☐ vero ſenſibilem inde nanciſcitur adſtrictionem ut utrenerrimam.
- 20.) Acida magis Sanguineis, Moſa Cholericis, & Melancholicis, imo quibuſlibet conveniunt.
- 21.) ☐. informa pulverulenta magis alterat. in potu vero, adeoque in forma diluta exhibitum, magis lubricat.
- 22.) Acida, ut & Saccharata, convenienter data, in febris non adeo reformidanda ſunt, uti Recentiores nonnulli orbi perſuadere tentarunt.
- 23.) Mixture ſimplex viris magis confert, quam ſceminis. (nempe proſpecto diaphoretico)

## FEBRIBUS INTERMITTENTIBUS.

Harum notanda ſunt

1. *Signa diagnostica*, & quidem

1.) Generalia:

- ) Frigus & calor patientis, pallor & rubor. ſubſidentia & turgeſcentia externi habitus corporis alternantes, ſine cauſa aliqua occasionali extrinſeca in præſens urgente, coorientes:
- ) Recuſus horum ſymptomatum per periodos ut plurimum ſtatas, intervalla ſenſibilia formans, modo breviora, modo largiora: ubi frigus, ætus, ſitis, inquietudo, ſomni defectus, virium proſtratio, animi taſtidium, & *ſuſcepſio* ita remittunt, ut ad plenariam orthoſtadiam patientes redeant.

2.) Specialia, nimirum

1.) Tertianæ, quæ

- ) Inſadit horis antemeridianis, à jentaculo uſque ad prandium, & quidem
- ) cum notabili horrore, qui ad actualem membrorum ſuccuſſationem non raro procedit.
- ) Incipit ordinarie conſtrictorius ac refrigeratorius hic ſenſus à regione lumborum, indeque per longitudinem dorſi ſurſum atque antroſum verſus Scrobiculum Cordis diffunditur.

•) Succedit nauſea, quæ in vomitus ipſos non raro

- terminatur, idque fere certius in subiectis vegetioribus, junioribus, primis adhuc paroxysmis, it. ubi horror, vel succussio sensibilior antecessit.
- \*) Interdum loco vomitus, Diarrhoea spontanea sequitur in subiectis annosioribus, aut magis, Phlegmatici temperamenti.
- \*) Durant hæc symptomata raro ultra horam unam vel alteram.
- \*) Legit his vestigia flaccida fatigatio & languor totius corporis, quem successive sequitur incallescetia, sæpe etiam satis præcipiti incremento, dolore insuper capitis, siti, amaritie oris &c. ut plurimum stipata.
- \*) Mitescet hoc æstus, demum erumpit sudor, præcipue quarto & sequentibus paroxysmis, it. quo magis tranquillius & continentius patiens sese gesserit.
- \*) Extendit sese æstus hic etiam Tertia legitima nunquam ultra horas 12., siæ secus, continuitatis suspecta est.
- \*) Recurrunt vero hæc omnia alternis diebus, ita, ut minimum intervallum 24. horarum, siæ intergrum *υποδιμετρον* interponatur.
- 2.) Quartana.
- 1.) Invadit hora tertia vel quarta pomeridiana.
  - 2.) Frigus format contumax & perquam sensibile, sæpe ad bihorium durans,
  - 3.) Sine horrore tamen & succussatione artuum præcedit & concurret, languor, gravitas, torpor fastidiosissimus totius corporis.
  - 4.) Sine Vomitu aut Diarrhoea, imo cum sensibili alvi adstrictione, etiam reliquo tempore intercalari perseverante,

5.) Se-

- 5.) Sequitur lento gradu calor, non vehemens quidem, odiosus tamen, & admodum molestus patienti,
- 6.) Siccus, sine sudore comitante, aut subsequente,
- 7.) cum perturbatione capitis vertiginosa, & dolore obtuso, non exquisitè lancinatorio.
- 8.) Durat æstus ad quatuor ad sex horas, raro diutius.
- 9.) Redir patiens ad plenariam orthostadiam atque per duos dies integros in hoc statu perseverat, quarto quovis die autem recurrit impetus morbi.
- 3.) Quotidiana, quæ quidem rarior.
- 1.) Invadit tempore matutino, hora sexta vel septima circiter.
  - 2.) Cum frigore & horrore satis notabili, ad horæ spatium durante,
  - 3.) Vomitus quoque, aut Diarrhoea spontanea, aut ambobus simul stipata.
  - 4.) Succedit æstus satis vehemens, cum dolore capitis, inquietudine, siti.
  - 5.) Totus enim paroxysmus raro sex horas transcendit,
  - 6.) Singulis tamen diebus recurrit, tempore vel prorsus eodem, vel plane diverso, anticipando, vel postponendo.
- 4.) Tertia duplex
- Singulis quidem diebus affligit, ita tamen ut non singuli paroxysmi, sed alterni sibi respondeant, v. g. hodie invadit hora decima antemeridiana, postero die hora secunda pomeridiana, tertio die hora decima antemeridiana, & quarto die hora secunda post meridiem denuo recurrit.

II. Sub-

1. *Subiectum.*

Tertiana familiarius occupat sexum virilem, quam femininum, ætatem juniorem, indolem activiorem, Naturas sensibiliores. Facile oboritur etiam personis nauseabundis, à nausea ab assumptis violenter cohibita, ne vomitus mox subsequatur.

III. *Prognosis.*

- 1.) Febris Tertiana modo diætæ ac regimine conveniente sublevetur, ex propria sua indole nunquam in exitum periculofum ruit, quin potius patientem, post eandem rite exantlatam, communiter saniores & robustiores evadunt. Unde ipsius quoque Vulgi assertio: Man werde nach dem Fassen recht gesund.
- 2.) Quodsi tamen per diætam inordinatam, regimen incongruum, aut medicamenta sive nimis exagitantia; sive intempestive cohibentia turbetur aut protrahatur, aut contra irritetur, facile degenerat, priorique casu, in oppilationes Viscerum, Hepatis, Lienis & Febrem lentam Hæticam, Cachexiam, præcipue in anofioribus, Phlegmaticis, Melancholicis, Sedentariis, parum bibentibus; posteriori vero casu transit in Febres acutas viscerum, inflammatorias, præcipue in Sanguineis, Cholericis, Junioribus, plethoricis, vinosis, iracundis.
- 3.) Quandocunque debita excretiones per Vomitus & Diarrhœam vegetè & expedite procedunt, mador etiam, aut sudor lenis sub declinatione erumpit, is ipse quoque à patiente tranquillâ continentia fovetur & promoveretur, tunc indies ab uno paroxysmo ad alterum decrevit Febris, tum ratione impetus, tum ratione tenoris, intermedii diebus redit insignis alacritas; appetitus & tolerantia ciborum, somnus profundus & quietus.

## 4.) Quo

- 4.) Quo vero minus id succedit, tanto sæpius recurrit æquali propemodum vigore paroxysmi, nisi quod vires magis magisque languescant.
- 5.) Post commissum errorem aliquem diæteticum, proximus paroxysmus ut plurimum solet esse impertunior.
- 6.) Quo magis plethora sensibilibus concurrit, eo gravior & diuturnior est æstus & dolor capitis; eo minus primis præsertim paroxysmis, sudor spontaneus sequitur; eo facilius medicamentis calidioribus aut per cohibitiones intempestivas exasperari, atque in Febres acutas inflammatorias præcipitari potest.
- 7.) Si in Febre tertiana quidem à primis usque paroxysmis nulla, aut levissima horroris, concussio se se exerat, frigus vero ipsum diu duret, neque tamen adeo intensum sit; languida & in longum tempus excurrentis Febris indicium esse solet.
- 8.) Febris tertiana, nunquam meliore fide cessat, & sanieram, sanitatem post se trahit, quam ubi, sensim decrecente paroxysmorum & impetu & duratione, ita gradibus veluti quibusdam, atque passibus peculiaribus decedit.
- 9.) Febris quartana typum suum constantissime & exactissime observat, raro postponit, rarius anticipat, aut, si hoc facit, continuitatis suspecta est.
- 10.) Febres quartanæ sibi relictae admodum diuturnæ sunt, & facile ad plures menses extenduntur, neque facile sponte ad tranquillitatem redeunt, nisi contingente forte insigni aeris mutatione, v.g. verno tempore.
- 11.) Quartanæ facile recidivant, tum si magis suppressæ, quam curatæ fuerint, tum vertente anno à prima invasionem.



- 11.) Reciprocantur interdum Quartanæ cum Ictero, Dyspnoea, Oedematosis, Asciticis, Tympanicis tumoribus, Cachexia, Tabæ: ita, ut Quartana his, & talia Quartanæ succedant, interdum conjungantur & concurrant, superveniant & complicantur.
- 12.) Tumores oedematosi post Quartanam, imprimis in provectionibus, pessimi sunt ominis, atque non raro ipsam Hydropem sensim inducunt: post Tertianas equidem pariter nihil boni portendunt, interim non ita periculosi sunt, præsertim in junioribus, si mature conveniente methodo & congruis medicamentis occurratur.
- 14.) Appetitus auctior, quin voracitas insolita, loco nauseæ, paroxysmos antecedens, vel concomitans, in utraque Febre, utplurimum diurnitatem ejus portendit: unde & vulgo male audiunt tales Febres, quas Græci Siebre vocant.
- 15.) Post cohibitionem Febris utriusque per Corticem Chinæ factam, non raro sequitur appetitus auctior: cui dum nimis indulgent patientes, facile recidivam incurrunt.

#### IV. Remedia, quæ respiciunt

- 1.) Materiarum morbificarum, quæ utplurimum in primis viis, aut circa easdem hæret
- a.) Correctionem, ut Absorbentia, Incidentia tam Digestiva Sinu, quam Resolventia acriuscula Vegetabilia, ut Rad. Ari. Piper, Zingiber, Sem. Sigetabii, ut Rad. Ari. Piper, Zingiber, Sem. Sigetabii, Gummata temperatiora: Ammoniacum, nappi, Gummatum temperatiora: Ammoniacum, Galbanum, Sagapenum (exclusa tamen Myrrha, quæ nimis æstuosa,) Herbarum capillares, & alia Hepatica & Splenetica dicta, v.g. Rad. Taraxaci, Chelidonii, Herb. Agrimon. Centaur. min. &c.

β) Eva-

- α) Evacuationem, ut Emetica & Laxantia blandiora, præsertim cum supra dictis aperitivis & incidentibus sociata, v.g. Pilulæ Becccher. Quercetan. Tartaræ Bontii, &c. quin & Diaphoretico diu-merica temperata, v.g. Rad. Helen. Vincetox. Pimpinell. & ex his parata Ess. Alexipharmaca.
- 2.) Symptomatum mitigationem.
- 1.) Frigus nimis vehemens ac diuturnum sublevent Linimenta & Balfama Stomachica, scrobiculo cordis & spinæ dorsæ applicata, vel solus V. Ruffi cum linteis quadruplicatis regioni Epigastricæ impositus.
- 2.) Æstus, Sitis, Cephalalgiam enormem moderantur Dofa, &c. v.g. Jus Olii, Ori, Clystus Olii, Succus Citri, (quod acidum Naturæ humanæ amicissimum,) Diluentia, v.g. Infusum Thèe, Veron. vel Potus tenuior ordinarius, non nimis frigidus, neque etiam adeo anxie calefactus. Languiorem & fatigationem, quin & Æstus proximi paroxysmi lenit Sudoris spontanei per continentiam tranquillam persecutio, quin aliqualis per temperata Alexipharmaca promotio.
- 3.) Ventriculi & primarum viarum roborationem, per
- a.) Amara non nimis ingrata, Stomachica vulgo dicta, v.g. Rad. Gentianæ rubræ, Summ. Cent. min. Tanacet. HB. Card. Bened. Absinth. scordium, & hoc nomine ipsa Ess. Alexipharmaca, præsertim cum Ess. Gentianæ sociata.
- β) & da temperata, & & da correctiora, v. c. Tinct. Olii Martis Ludovici, si inappetentia post febrem superatam diutius perseveret.

4) Motum veluti in consuetudinem dedicationum contributionem, quod faciunt

- 1.) Anodyna, sedativa, v. c. geminæ Pilulæ Wildergansii aut Mauthæi, siue Starkeyanæ veræ, vespere præcedente ante paroxysmum instantem exhibitæ.
- 2.) Subadstringentia, ut Cort. Chinæ & Crocus. Tenentior versus paroxysmum, non tamen proximè ante eundem imminuentem propinandus.

#### ¶ Methodus medendi.

##### 1.) In Tertianæ

- a.) Verius paroxysmum, s. e. una vel altera hora ante eundem, exhibeantur Digestiva cum absorbentibus & temperantibus, v. gr. Pulvis ex Conch. præparat. & diaph. ☐ Glatus, ☐ aa. ad ℥j. vel gr. xxv., ita plerumque sequitur Vomitus spontaneus, etiam si primis paroxysmis nullus talis eructuerit.
- b.) Sub paroxysmo, præsertim æstuosa ejusdem parte, Potus sufficiens concedatur, non modo non inebriativus, sæculentus, actu frigidus sit, aut nimis haustibus ingurgietur, qui, si Aëstus & Sitis vehementius urgeat, pro Sanguineis leviter acidulari, pro Cholericis & Melancholicis Temperari potest.
- c.) Deiepercente æstu observetur spontanei madoris eruptio, quæ si appareat, Sudor hic spontaneus tum quieto regimine, tum moderata Dosi Ess. Alexipharmacæ placide promoveatur.
- d.) Die vacuo continuentur pulveres absorbentes digestivi, cum Ess. Alexipharm.
- e.) In Febre languidiore & lentescente interponantur lenes laxationes, siue per Pilulas ex Extr. Fumar.

Ab

Abfinth. Card. bened. Gummatibus temperantibus, & paucissima Aloë paratas, siue per Infusum aut Decoctum ex Rad. Cichor. Tarax. Herb. Fumar. Agrimon. Card. bened. Rad. Polypod. Rhabarb. Helleb. nigr. Fol. Sennæ & similibus.

##### 2.) In Quartanæ.

- 1.) Versus paroxysmum sola Digestiva sine absorbentibus aut parciore dosi junctis exhibeantur, v. gr. ☐ Glatus ad gr. xv. sesqui horam ante paroxysmum datus.
- 2.) Sub æstu nihil moveatur aut innoveretur.
- 3.) Diebus intercalariis continuentur Digestiva, iisque amara Stomachica jungantur, v. g. Ess. Gennianæ, cum Ess. Alexipharmacæ, aut Ess. Pimpinellæ seorsim paratas, mixta & versus prandium atque coenam ad gutt. xl. exhibita.
- 4.) Interponantur quandoque lenia Laxantia, lentorem materiæ viscidæ simul corrigentia, & tonum Ventriculi roborantia, quæ vulgo Aperitiva & Stomachica audiunt, v. g. Pilulæ Becherianæ, aut Infusa ex supra dictis simplicibus parata.
- 5.) In utraq. Febre continua, iore, & consumta aut expulsa materia morbifica, ubi soli motus per assuetudinem diuturniorem veluti in habitum ducti supersunt, quando nimirum, siue sponte, siue præsentus sub tali medicatione, eo deveniunt patientes, ut tempore intercalari appetitus & vires sibi recte constare videantur, spontanea quoque lassitudo, & torpor evanuerit, recte dormiant & somno subleventur, adeoque nihil habeant, de quo conquerantur, nisi quod tempore consueto paroxysmi solitis symptomatibus (quæ ta-

G 3

meo



men ut plurimum breviora & mitiora, affligantur: tunc Siftentia locum habent, five per famosum illum Cort. Chinæ five per Crocum Pius giatum ad gr. iv. vel v. aliquot horas ante paroxysmum exhibiturum.

#### VI. Cautela Prædicæ.

- 1.) Tertianæ legitimæ probe discernendæ sunt, à Spuriis sub-continuis, quæ ut plurimum frigus lenius & brevius, æstus vero vehementiorem & diuturniorem atque præterea symptomata aliqua insolita, v. g. Tussim afferunt, post paroxysmos etiam languorem, lassitudinem artuum, capitis gravitatem vertiginosam, striculositatem, somni inquietudinem, inappetentiam, jugiter perseverantes, post se relinunt.
- 2.) Febres Epidemicæ acutæ incidentes in tēpus verum, aut tempestatem vernæ similem, & corpus insuper circa primas vias impurum, sæpe simulat al quantisper typum tertianarium, eum notabili ratione continuitatis malignitate: ita, ut non raro Malignæ pecthiales, Purpuram aliæque Exanthemata simul parturiant.
- 3.) Quartanæ diu æstuentes, vespertinæ, aut nocturnæ, aut vagæ, in continuitatem vergunt.
- 4.) Continuitas Febris quartanaræ est admodum insidiosa & lenissimæ febrilis hæcticæ indolis. Aestus est mitior, caloris naturalis gradum vix notabiliter excedens, appetitus est debilissimus, aut, si quodammodo adhuc vigeat, magis ad insipidum frigidum, pro duriora esculenta fertur: Aegri striculosi sunt, cum pauca spumida Siva, morosi & tædiosi, somnolenti, languidi, lassi, nullum tamen ex somno levamen



vamen percipiunt. alvus constanter est sicca, vires indies magis atteruntur.

- 5.) Febres intermittentes, præsertim vero Quartanæ, personis diu antea cum ambigua valetudine colluctatis eventientes, longe circumspiciendus & lenius tractandæ sunt, quam, quæ hominibus hæcenus integra quæ florida sanitate gavisis, obtingunt.
- 6.) Longe enim diligentius tum insistentium Aperitivis & præparantibus, atque suspensio admodum gradu ad Evacuantia, imo longe cautissime ad Siftentia est progrediendum.
- 7.) Habent in Tertianis locum Vomitoria, cavendo saltem, ne motus provocetur, materia nondum mobili reddita. Alioquin patientes inutiliter fatigantur, vires franguntur, ita ut ad debitam motuum & excretionum prosecutionem vix sufficiant.
- 8.) Quod si tamen resolutio saltem materiæ morbificæ per congrua medicamenta rite peracta sit, vix unquam vomitu per artem proritato opus est, sed sequitur vel sponte, facilius & placidius in ipsis paroxysmis, vel tacite correctâ jam materiâ per sedes ordinarias rejicitur.
- 9.) Quartana, ut in se lento progressu, & motu leniore gaudet; ita etiam commotiones artificiales impetuosiores difficillime perfert, non solum per Emetica violentiora & Cathartica drastica, sed ipsa quoque Alexipharmaca sub paroxysmis, præsertim cum regimine sudorifico data.
- 10.) Sudorifera in ipsis paroxysmis Quartanarum exhibita, præcipue subjectis paulo magis plethoricis, vertiginosam perturbationem capitis, & alvi adstrictionem pertiniaciorem causantur.

✽) Cra.

- 11.) Crocus & Galis tenerior in sistendis & cohibendis motibus febrilibus non solum æque præsentem efficaciam, ac famosus ille Cortex Peruvianus exerit; sed & in eo huic ipsi præferendus est, quod alvum non ita occludat, uti Cortex iste exoticius plerumque facere solet.
- 12.) Quod si tamen post cohibitionem paroxysmorum, per ejusmodi adstringentia peractam, Patiens appareat, & quidem imprimis constanter lassus, gravatus, fastidiosus, & circa præcordia ac hypochondria sensibiles pressiones perseverent: tum præstat paroxysmos revocare: quod fit commodissime per temperatam, sufficientem tamen, laxationem: Quo in casu Pilulæ Becherianæ, vel potius Stahlianæ, ut ut valide alias non laxent, admodum præsentis sunt efficacis.
- 13.) Tumores Osedomatosi, post febres, imprimis autem Quartanas superatas, evenientes, circumspicte admodum tractandi sunt. Cavendum hic à fortioribus purgantibus, ab acrioribus alcalicis, & magis adhuc à Salibus Ab. Præstant Sisa mediæ naturæ, cum lenissimis & ibus, v. g. R. Arcan. dupl. vel S. Blat. gr. viii. Croci & is. Galis gr. ii. M. pro dosi interponendo tam laxationes lenissimas, quam remedia amara, Stomachica, Tonica, & Hepatica, Aperitiva dicta: quæ methodus etiam in Atrophia in tantum cum duritie & inflatione abdominis conjuncta, it. in aliis Hepatis & Pancreatis obliptationibus subinde laudabilem operam præstat.
- 14.) Post curatas, & bona quoque fide cessantes Febres intermittentes, utile, quin necessarium est regimen conveniens, tum refrigerium, præsertim ab aëre

- humido, nimiamque ventriculi operationem vitando, tam motus proportionatos suscipiendo: confert quoque continuatus usus Tonico-Stomachicorum.
- 15.) Quin & anno vertente regimen tale circa Res Non naturales exquisitius opus est: alias Recidivæ periculum imminet.
- 16.) Digestiva vegetabilia non modo segniora sunt, sed foveant etiam sub acrimonia sua Sinam quandam volatilitatem, stimulantem, qua sanguinem commovent, & aliquod incrementum ipsius æstus inferunt, Præferenda itaque his ipsis sunt Digestiva Salina, præsertim ex Sado Olico & Alcali fixo composita.
- 17.) In febribus tamen sentescentibus, aut Subjectis Phlegmaticis ea ipsa quoque locum habent.
- 18.) Laudabilem quoque tunc operam præstant amara, imprimis Centaur. minus, quod Quartanariis speciatim commendandum, & quibusdam vel solum sufficit. Carduus benedictus ut ut satis quoque amaricet, hanc efficaciam tamen in Febre subigenda non attingit, Febre autem jam superata, virtutem tonicam, roborantem satis eximiam exerit.
- 19.) Decocta tamen & Infusa ejusmodi amaricantia in Subjectis tenerioribus & sensibilibus non undique tuto adhiberi possunt; præsertim, cum in notabili quantitate, si optatum effectum edere debeant, assumenda sint.
- 20.) Facile tamen propter nimiam amaritiam, colorem præsentem, Hæmicam inducere possunt; Præstant sere Extracta horum simplicium.
- 21.) Absorbentia præsertim solitaria, & assatim ingesta in Quartanis lentorem materiæ febrilis augent; ita ut facile hinc in typum lentum vel subcontinuum degenerent.



# FEBRIBUS ACUTIS, EPIDEMICIS, MALIGNIS ET CONTAGIOSIS.

Quarum notanda

## I. Signa Diagnostica.

- 1.) *Acutarum Februm* Signa Pathognomonica sunt *brevitas* & *præceps* vel ad salutem vel ad mortem *exitus*, intra unum, alterumve, aut ad summum sextum septenarium (h. e. dies 40.) ad finem pertingens.
- 2.) *Epidemicarum Februm* signa sunt:
  - 1.) *Frequentia* inter plures patientes.
  - 2.) *Modus invadendi* unus idemque.
  - 3.) *Symptomatum eorundem*, quæ in aliis observantur, *concurfus*.
- 3.) *Malignarum Februm* signa sunt:
  - 1.) *Magna* & *præceps* virium prostratio, testimonio imprimis *pulsus debilioris* confirmata.
  - 2.) *Symptomatum febrilium*, citra manifestam causam, & sine ullo proportionato utili effectu, insolita *exacerbatio*: vel contra symptomatum concurrentium *insidiosa dissimulatio*.
  - 3.) *Lipothymia* statim in initio, aut incremento concurrentes.
  - 4.) *Animi desperabunda abjectio*, ac præmaturum *lethalis exitus præsagium*.
  - 5.) *Sitis* & *dolorum quorumlibet inadvertentia*.

6.) Men-

- 6.) *Mentis vacillatio*.
  - 7.) *Agrypnia incessabilis*.
  - 8.) *Exanthematum præmatura*, & *vaga eruptio* vel *subitanea retrocessio*.
- Contagiose* dicuntur, quia facile in adstantes, cohabitantes, conversantes propagantur; ita, ut si unus e familia aliqua decumbat, plerumque omnes domestici successive inficiantur, quasi sic alle dran müssen.
- II. *Species diversæ*
- 1.) *Pestilentes* vocari solent, quæ *Anthraces* ac *Bubones* parturiunt, & apud plerosque exitum funestum fortuntur.
  - 2.) *Perechiales*, quæ *Maculas moribus pulicum* non absimiles exhibent.
  - 3.) *Hungaricus morbus*, sive *Febris Castrensis* audit, quæ admodum tempestivis & valde pertinacibus deliriis, anxietate insuper præcordiorum enormi stipatur.
  - 4.) *Febres Epidemicæ* aliæ, benigniorem typum simulant, plerumque *Vere Tertianarum*, *Autumno Quartanarum*, *Vere adultiore Pleuriticis*, *Æstate proVectiore Dysentericæ*, *Autumno humidiorie Catarrhorum*, *Tussis* imprimis schemate larvari solent.

## III. *Subjunctum*.

- 1.) *Febribus Epidemicis* facilius obnoxii sunt homines timidi, penitabundi, Pueri, Fœminæ, Literati.
- 2.) *Febres Epidemicæ* omnes, quantumcumque benigniores appareant, si *continuitas insidiosa*, *debilitas insignis*, & *similia* concurrant, semper aliquid nostri alunt:
- 3.) Imo, quo leniores quoad symptomata febrilia generalia,

H a

neralia,

neralia: æstus, sitis, &c. apparent, tanto maligniores sunt.

- 4.) Infoluta *Animi* circa initia morbi trepidatio, vel præmaturum finistri eventus præfagium, ut plurimum vero lethalem exitum portendit.
- 5.) Febres Pestilentes
  - a.) Salutariter finiri observantur
    - 1.) largis sudoribus in ipso initio,
    - 2.) Anthracibus,
    - 3.) Bubonibus, utrisque tamen mature erumpentibus, nec retrocedentibus.
  - b.) Exitum vero afferunt,
    - 1.) Si nulla talis excretio tempeſtiva contingat;
    - 2.) vel facta, iterum dispareat, & retrocedat;
    - 3.) vel ad interiora Viſcera vergat, & Diarrhœas, Urinas discoloras, Vomitus, five conatus vomendi pertinaces inducat.
- 6.) Febris Castrenſis, licet plerumque quoad symptomata, impetuoſior appareat, quam Petechialis, taciturnâ imprimis & veluti diſſimulata;
- 7.) Petechiæ tamen nimis maturæ & copioſæ erumpentes, vagæ it. ac inconstantes, coloris ſaturatiſſimæ, multo magis vero lividæ, finistri ſunt ominis.
- 8.) Melioris ſunt ſpei, coloris roſei, circa diem criticum, ſeptimum videlicet effloſcentes, poſt tres vel quatuor dies iterum ſenſim evaneſcentes, ac ægrum aliquatenus ſublevantes.
- 9.) Purpura miliaris cum ipſis Petechiis ſimul, tanto magis vero præmature, tertio vel quarto die erumpens, periculo non caret: tolerabilior eſt, quæ petechialibus maculis ſuccedit. quin ipſis maculis inſaſcitur.
- 10.) Alvi adſtriſtio in Febribus Petechialibus reliqua ſym.

ſymptomata, præcipue caput affligentia, manifeſtè exacerbant;

- m.) Diarrhœæ Febribus Petechialibus non raro ſponte ſuperveniunt, quæ non ſolum innoxie, ſed etiam habito reſpectu ad noxas, quas adſtriſtio alvi inferit, utiles dicendæ. Interim tamen morbum non ſolviunt: multo minus artificiales laxationes his æquiparandæ ſunt, aut ſubſtituendæ.
- 11.) VS. in Febribus Epidemicis Petechizantibus adminiſtrata, ſine ſubjunſto jugi regimine Diaphoretico, circa dies criticos Congeſtiones humorum circa caput & molimina Hæmorrhagica, Deliria, Aphthas, periculoſo cum eventu poſt ſe trahit.
- 12.) Hæmorrhagiæ in Epidemicis quoquo tempore contingentes, melius eſt non fieri, quam fieri: imolargiter recurrentes, alvo præſertim ſiccior, it. Deliria & Aphthas poſt ſe trahentes, plerumque lethales ſunt: diurnioribus vero deliriis tandem ſupervenientes, illaque ſublevantes tolerabiliores exiſtunt.

#### V. Remedia

- Sunt illa Febrifuga reliquis Febribus communia, & ſuperius jam commemorata, niſi quod Specifica hic forte dari poſſint, v. g.
- a.) In Peſte laudantur Oſſa hominum eadem lue interemtorum, ad imitationem morſus canis rabidi, per hepar aliud, vel ejusdem canis rabidi certo perſanabilis; it. emollicionis oſſium per Gramen oſifragum Norvegicum, quæ per exhibitionem oſſium pulveriſatorum alterius jumentum, præcipue eodem malo extincti, curari ſolet.
  - b.) In Petechialibus Dn. Apinus ſingulari Encomio eſt.

fert certam Corticis Peruviani speciem, quam vulgo Schacharillam vocant, impræmis vero Extrahum, per ∇ Stam exinde paratum.

# VI. Methodus Medendi cum Cautelis Prædicis.

- 1.) Cura in genere excretionem periphericam i. e. Diapnoën placidam, jugem tamen atque assiduam unice intendat, ab omnibus evacuationibus præmaturis & violentis, aut per viscera nobiliora extendendis, v. g. Vomitu & Catharsi aliena esto.
- 2.) In Petechialibus, quo magis ad regimen sudorificum, & medicamenta calidiora restringitur medicatio, eo maturius & copiosius prodeunt maculæ, facilius tamen retrocedunt.
- 3.) Si Venæsectio inconsulto Medico jam præmissa, aut regimen calidius jam inceptum fuerit, magis actuali Diaphoresi succurrendum, & regimen diaphoreticum semel ceptum constanter continuandum.
- 4.) Solicite semper spontanea ægrorum ex Febris Epidemicis convalescentia observetur, motusque & viæ, quibus ipsa Natura utitur, attendantur.
- 5.) Major semper legitimi decursus ipsius Febris, quam symptomatum quantumcunque atrocium ratio habeatur.
- 6.) Quantum tamen citra præjudicium motus febrilis primarii fieri potest, horum quoque mitigatio non negligatur, v. g.
- 7.) Capitis Dolores acuti, pungitivi, Camphoratis externis leniantur; aut Unguento Alabastrino camphorato. Præterea Osis & temperantibus insistendum. Emulsiu quoque tanto frequentius exhibenda; Al-

vus

vus non proritanda, expedienda tamen observetur.

- 8.) Lipothymia, debilitates insignes diligenti usu Bezoardicorum, eorumque parvis, sed repetitis Dosis, potu sufficiente & analeptico, tum etiam Cinnabarinis subleventur.
- 9.) Taciturnitas insolita, & quas prælagit mentis motiones, aut somnolenti affectus, potu sufficiente, non inebriativo, Bezoardicis, Analepticis, Cinnabarinis & Topicis camphoratis oppugnentur.
- 10.) Vigiliæ Narcoticis nunquam oppugnentur, præcipue si paroxysmus, quod fere fit, in noctem incidat. Sufficiens Potus, Potiones Analeptico-alterative, Emulsiões, Cinnabarina, Osa, quod non efficiunt, Opiatis vix unquam obtinebuntur.
- 11.) Exanthematum retentio & retrocessio, interne Alexipharmacis repetito exhibitis, externe continentia quæta ac regimine diaphoretico patientissimo, lenibus frictionibus & in casu ancipiti, Vesicatoriis adjuvetur.
- 12.) Faucium affectibus anginosi & Aphthis, Gargari-smata leniter adstringentia cum Alexipharmacis internis, & extus apposita Discutientia camphorata subveniunt.
- 13.) Frictiones lones crurum & pedum cum linteis calidis vel excorta etiam aliquid præstant, sed cavendum, ne pedes refrigescant.

## INFLAMMATIONIBUS ET FEBRIBUS INFLAMMATORIIS.

*Inflammationum notaada sunt*

### I. Definitio:

*Inflamatio est motus partialis sanguinis auctioris, quo Natura sanguinem in parte aliqua subsistentem, sive motu progressivo privatum, & coagulatum, indeque in corruptionem putredinosam prouenit vel maturè discutere & rursus fluidum reddere, vel agilioribus fermentativis particulis subtractis, in consistentiam materiæ pulposæ innoxia, quam pus appellamus, redigere conatur. Motus hic particularis auctor facillime quoque in universam massam sanguineam diffunditur, & tunc Febris inflammatoria appellatur.*

### II. Species.

#### 1.) Aliæ Inflammationes sunt

- a) Apostematodes, quæ partes carnosas, vel glandulosas insident, ac magis in profundum penetrant.
- b) Erysipelaceæ, quæ partes exsanguæ & membranaceas afficiunt, & magis in larum superficie tenus diffunduntur.

#### 2.) Aliæ sunt

- 1.) Externæ, ut Tumores inflammatorii Parotidum, Mammarum, Testium &c. Furunculi in variis partibus carnosæ emergentes, Erysipelas faciei, brachiorum, manuum, genuum, tibiæ, pedum.

dum, Ophthalmia, seu Inflammatio tunicæ adnatæ oculorum, imo interdum palpebrarum.

- 2.) Internæ, ut Phrenitis, sive inflammatio meningum cerebri, Angina, sive inflammatio musculorum & glandularum Laryngis, Pleuritis, sive inflammatio Pleuræ, Peripneumonia, sive inflammatio Pulmonum, Paraphrenitis, sive Inflammatio Diaphragmatis, Hepatitis, sive inflammatio Hepatis, Nephritis, sive inflammatio Renum &c.

#### 3.) Aliæ oriuntur à causis

- 1.) Externis; contusione, lapsu, nisu fortiori, refrigerio repentino.
- 2.) Intrinsecis; quæ moto quasi critico certam quasi partem invadunt, ut Phrenitis, vel Angina, febribus acutis malè cedentibus superveniens, tumor inflammatorius mammarum à terrore incusso, Erysipelas ab ira vel terrore graviore, tumor inflammatorius testium vel glandularum inguinalium à Gonorrhœa intempestivè suppressa, Furunculi hominibus plethoricis & ventilationibus sanguineis assuetis evenientes.

### III. Signa, & quidem

#### 1.) Inflammationis externæ sunt:

- 1.) Tumor, partis alicujus mollis & porosæ haud ita pridem enatus, durus & renitens, rubens etiam, si cutis una affecta sit
- 2.) Ardor, sive calor, naturali major, etiam externo tactu perceptibilis, longe magis tamen ipsi patienti sensibilis, imo
- 3.) Dolor punctior, pulsus micationibus respondens, exquisitior in partibus carnosæ, obusior in locis glandulosæ.



2.) Inflammationum internarum signa diagnostica ut plurimum paulo intricatiora sunt, & minus evidenter, præsertim circa initia, possunt tamen attendi sequentia:

- a) Dolor ardens, lancinans in aliqua regione, sub qua Viscus aliquod delitescit, pro diversa tamen Viscerum sensibilitate varians; in Pulmonibus enim Pleura, Renibus, Ventriculo maxime sensibilis, atque illic cum Tussi, isthic cum Ischuria vel Dysuria, hic cum Cardialgia conjunctus, in Hepate vero, Liene, Pancreate obtusior.
- b) Febris acuta cum horrore insigni invadens, aestu vehementissimo interiora præcipue affligens, ac propterea sitim inextinguibilem, & magnam faucium siccitatem, potui mox iterum succedentem, excitans.
- c) Perpetua habitus externi corporis horripilatio facillime recurrens, si ægri leviter saltem corpus ventilent.
- d) Urinarutians, per moram deponens sedimentum rosei coloris, primis diebus tenerius, circa declinationem verò tenacius, & lubmucidum, quod proinde nonnulli pro pure habuerunt.
- e) Prægressæ vehementes corporis motiones cursibus, saltationibus, ponderum graviorum, eum forti nisu, tractationibus, in partu difficiliore factæ, repentina, commoto, & expansio vehementer sanguine, habitus externi retri-generationes, aut internæ quoque à potu frigido, mox & intemperanter superingesto, sanguinis commotionibus febrilibus repente appo-

sitæ

sitæ medicationes adstrictioræ, dolorum Arthriticorum aut insensibilium in erysipelacearum inconscultæ retropulsiones.

#### IV. Subjectum.

Inflammationibus facilius obnoxii sunt personæ status plethorici, habitus laxioris, porosioris.

#### V. Prognosis.

- 1.) Eventus Inflammationis est quadruplex, nam vel
  - 1.) resolvitur iterum per discussionem successivam, qui modus omnium optimus: vel
  - 2.) suppuratur, quod in externis inflammationibus, præterquam in erysipelaceis, etiam tolerabile: vel
  - 3.) desiccatur in Scirrhum, quod ad minimum in futurum periculosum est: vel
  - 4.) denique abit in gangrænam & sphacelum, quod præsentissimum periculum affert.
- 2.) In inflammatione externa proinde, si tumor, durities, ardor & dolor punctuarius ultra quartum diem perennet, imo jugiter insoleat; non amplius discussio speranda, sed suppuratio expectanda erit.
- 3.) Abscessuum suppuratorum mundificatio & consolidatio in partibus glandulosis longe laboriosior est, quam in carnosis; imo sine subsidio artis & manuali repurgatione vix perpetranda; imo in visceribus internis & Natura & Arti præmodum impossibilis.
- 4.) Si Stasis valde sit magna, fibræ flaccidæ & enervatæ, aut planè laceratæ & contusæ; nec discussio, nec iusta maturatio commodè fieri potest, adeoque facile Gangræna & Sphacelus supervenit.
- 5.) Si rubor partis affectæ in colorem bruneum aut livorem degeneret, cum striis circum circa ex rubro nigri-

gricantibus, quas Vibices appellant; aut contra, si cutis decolor evadat, & pustulæ hinc inde emergant, ichorem subcruentum stillantes, Gangræna præsto est. cui, si frigus, partis insensibilitas, fœtor superveniat, sphacelus non tam imminet, quam invalescit.

6.) Inflammationes internæ omnes periculo sunt plenissimæ.

7.) Quæ non perneciter perniciose sunt, lentas tamen hecæcas confusum puones post se trahunt.

8.) Perniciosissimæ sunt inflammationes Hepatis, post has Stomachi, Intestini duodeni, Pancreatis, Uteri; proximæ ab his Splenicæ; postremæ ad perniciem Nephriticæ sunt; Pleuriticæ & Peripneumoniciæ in junioribus non adeo perniciose, magis tamen in annosioribus.

9.) Eximii itidem periculi sunt inflammationes internæ externis congestionibus Arthriticis, vel Erysipelaceis retropulsis supervenientes.

10.) Exitus huiusmodi Februm inflammatarum est, ut successivè dissolvantur, communiter tamen diebus criticis, ut vel per hæmorrhagias narum, vel per sudores copiosos spontaneos, sive per alvi dejectiones alternatio quædam suscipiatur & sequatur. Si hoc non fiat, ut criticis diebus, & imprimis primo Septenario solutio sequatur, tunc suppurationis, vel Sphaceli metus est, quorum utrumque ferre æque funestum est.

11.) Urina, si circa dies indicatorios, h. e. quartum, vel quintum turbetur, & sedimentum deponat, bonum omen præbet; contra, si clara maneat & limpida, aut licet turbetur, nullum tamen sedimentum de-

mit

mittat, sed parietes vitri alba, lactea & subcærulea cuticula obducatur, æstu & anxietate interim valde augescere impendens circa dies criticos periculum, Imo exitum portendit.

12.) Supervenit quoque communiter Febris his inflammatoriis, præsertim circa indicatorios, perpetua veluti sudatio, ut, licet copiosam aquosissimam non exsudent, leni tamen madore cutis jugiter affecta sit. Tolerabilius hoc ad minimum, quam ubi perpetua siccitate cutis aret, & sine ulla transpiratione largiori decumbunt ægri: longe enim magis sensibilem & anxium reddit patientibus æstum.

13.) Summa anxietas cum ingente ardore interno, multa perfrigeratio extremorum, Syncope anxia, Singultus contumax statui morbi superveniens, non vero ab externa refrigeratione coortus, Sudationes enormes, non modo non immutato morbo, sed crescente insuper debilitate, infanta sunt præsagia.

14.) Vomitus nigrae, aut fusco-nigræ materiæ instar Rob. Sambuci circa criticos, in talibus febribus propinquæ mortis signum; In chronicis morbis non adeo periculosum est talis vomitus.

15.) Imo talis defectio, aut colorum quoque aliorum insolitorum excrementa, per alvi fluxum isto tempore perumpentia, nullius boni præsigii sunt.

16.) Si dolores admodum urgeant, & indies velut augescant, magna quoque febris & summa inquietudo perennet, postmodum simul & semel omnis dolor evanescat, pulsus & vires cadant, febris tamen pergat; signum est, aut Sphacelum jam invaluisse, aut suppuratum, aut ruptum esse Abcessum.

## VI. Remedia &amp; quidem

Ab internis inflammationibus.

- 1.) Nimis copiosum affluxum interceptum & avertunt VS. revulsoria, repellentia & subadstringentia, item refrigerantia, v. g. Gum. rosaceum, Vinum rubrum stypticum, Saturnina, Bolaria, & inde parata Epithemata cum albumine ovorum, aut Emplastra defensiva. Facit etiam huc actualis compressio, imprimis ferro frigido facta.
- 2.) Sanguinem stagnantem & coagulascntem discutunt ea, quæ penetrantem acrimoniam citra visciditatem possident, v. g. Rad. Irid. Florent. Sigill. Salom. Bryon. HB. Hyssop. Abrotani, Sabin. Sem. Anisi, Fœnic. Carv. Cumin. Fl. Chamom. Sambuc. Anethi. Melilot. Summ. Origan. quæ Sacculis insui, Vino calido imbui, atque ita leniter rursus expressa applicari possunt. Inter hæc omnia tamen principatum fere obtinet Camphora, præsertim in V tenuissimo dissoluta, aut aliis formulis superadpersa. Ex compositis celebria sunt Empl. Diaphoreticum Mynsich. it. de Sperm. Ceti, nec non V camphoratus crocatus.
- 3.) Tensionem dolorificam leniunt, emolliunt atque ita suppurationem promovent mucilaginosæ & pinguis, e. g. Sem. Lini, Cydon. Pyll. Rad. Lil. alb. Alth. HB. Malv. Branc. Urfin. Parietariæ, Fl. Verbasci, Linar. cum cremore avenæ aut pane similagineo in lacte vel V cocta atque in formam Cataplasmatidis redacti; quibus & addi possunt Ficus, it. Pingv. Anseris. Anatis, Gallinæ, ut & Sæ per infusionem parata Lil. alb. Cham. Verbasc.
- 4.) Ructionem promovent ea, quæ præsentius & penitius emolliunt, ut Cephæ assæ, Pinguedo Leporis, Mel

Mel cum farina fecalina subactum, Panis mellagineus, Fermentum recens.

- 5.) Ipsam apertionem Abscessus suppurati præstat Cauteria porentialia, v. g. Magnes Arsenicalis, Causticum indolens Zvvingeri ex Calce viva, Minio & Sapone nigro, vel actualis Incisio manu chirurgica peracta.
- 6.) Mundificationem & consolidationem juvant acriuscula Nervina & Balsamica: Myrrha, Sagapen. Sarcocoll. Decoct. Herb. Vulner. it. Ess. Balsamica sequens ad gutt. XX vel XXX. instillanda:

R. Ess. Myrrh. ʒi.

Succin. ʒi.

℞ Therebinth. gutt. iij. l. i. v.

M. D. in inflammationibus internis.

- 7.) Stasis sanguinis resolvere & discutere traduntur Fl. Bellid. Chærefol. rec. in substantia usurpata. HB. Arnica in cerevisia decocta, Sperma Ceti, Mumia, sanguis Hirci exsiccatus, Rad. Rub. Tinctorum, Pimpinell. alb.
- 8.) Febri complicatæ prospiciunt Diluentia, præsertim calide hausta, v. g. Decoct. Rad. Cichor. Scorzon. CC. Eboris it. Absorbentia cum Fidis saturata, v. g. Lap. 69. & alia Ostracodermata in succo Citri exhibitæ; porro Diaphoretica fixa, inter quæ reliquis præstat ʒ diaph. Tandem Alexipharm. temperata, v. g. Mixtura simplex parcius camphorata, Ess. Alexiph. cui Ess. Scordii largius admixta, aut sola Ess. Pimpinell. c. æquali portione Ess. Scordii remixta.
- 9.) Sitim & ardorem internum mitigat, successum quoque

que alvi promouet ①, primis tamen diebus frequentius, post quartum parcius exhibendum.

- 10.) Dolorum atrociam leniunt Anodyna, v g. Ess. Laudan. fermentat. Langellotti, c. Ess. Mumiae; aut Ess. Anodyn. c. Tinct. Corall. & Liqueur. CC. succinato, it. Emulsionis ex Sem. Papav. alb. Card. Mariæ, Aquileg. Amygd. dulc. &c.

#### VII. Methodus medendi.

- 1.) In stasibus inflammatoriis externis ante omnia tenenda est Discussio.
- 2.) Si affluxus sit vehemens & subiectum plethoricum, VS. revulsoria insuper ex usu est.
- 3.) Quodsi tamen ultra quartum diem Stasis, Tumor, Dolor perseveret, quin augeat, maturatio, tandem apertio & mundificatoria abstersio est necessaria, quibus rite peractis, sponte sequetur consolidatio.
- 4.) In stasibus inflammatoriis internis unice tentanda est Discussio, placida tamen, & successu non cum impetu & vehementia.
- 5.) Febris conjuncta, cum ipsa quoque hanc discussionem intendat, nullo modo turbetur, aut supprimatur, sed quantum fieri potest, per tranquillam continentiam, per temperatum & lecti & coelavis calorem, it. per diluentia, Ocula, absorbentia c. & diis maritata, & alia diaphoretico diuretica subleuetur.
- 6.) Ubi dolores admodum insolescunt, & re vera urgent, habent usum Anodyna, sed modera un ad mitigandum, non vero ad tollendum sensum, in incrementum potius, quam circa statum.
- 7.) Alvus feruetur aperta, non tamen positive stimuletur.

VIII. Caut.

#### VIII. Cautela Practica.

- 1.) In omni inflammatione nocet & male refrigerium, quia sanguinem coagulat. nocet nimia humectatio, quoniam, fibras laxat & copiosiori irruptioni locum præbet: nocet intemperata adstricatio, quia ad unum & transiunt reliqui sanguinis fluidi portionem coagulatam resoluturi intercipit, & terrhosam indurationem inducit: nocet nimis calefacientia & siccantia, quia ardorem inutiliter augent & terrhosam indurationem promouent: nocet præmatura incisio, quoniam suppurationem debitam interturbat.
- 2.) In collectione sanguinis & hinc metuenda Stasis inflammatoria à collectione, dum adhuc fluxilis, imò in fluxu constitutus est sanguis, iuvat æqualis compressio ferro frigido facta, tamdiu continuanda, donec omnis dolor cessaverit.
- 3.) Si collectio sanguinis per contusionem extravasati nimis sit magna, ita ut tumor non durus sed tactu molli occurrat; matura incisio & sanguinis congruatieductio opus est, antequam accedat inflammatio: nulla enim iusta maturatio, neque etiam discussio tum est speranda.
- 4.) In initio inflammationum conferunt lenia adstringentia satumina, ubi scilicet materia adhuc fluxilis est; Contra vero in inflammationibus obfirmatis copiosius adhibenda, Ut era inducant mali moris, quæ sedent: N. sibi odore exultant Et hæc non incongruè appellantur.
- 5.) Si Stasis profundius hæret, atque Inflammatio cutem non simul affectit, neque albedo cutis, tanquam signum sufficientis maturationis, multo minus spontanea apertio est expectanda; sed si al-qualis mollities tactui occurrit, merito manu chirurgica est instituenda.

K.

6.) Quam.



6.) Quando Abscessus multum puris continet; non una vice omne est evacuandum, quia fibræ alias nimis flaccescunt. V. S. utilis est in inflammatione adhuc fiente, si status sit plethoricus, si copiosior affluxus metuendus, it. in inflammatione interna habet pariter locum, ubi corpus plethoricum, ubi graves commotiones sanguinis per fortiores motus, æstuosiores porum, abusum remedium calidiorum, &c. præcesserunt; tantò magis, si consuetæ V. S. nis tempus coincidat, it. ubi in ipso principio statim valde magnus, vehemens & anxius est morbus, cum summo ardore & interlancinationibus præf. dextræ partis abdominis, præf. si alvus non sit clausa, vel Clysteri prompte responderit, sine sensibili levamine anxietatis & doloris.

7.) Anceps, imò noxia est, si non circa prima initia administratur; id quod ob signa diagnostica ab initio obscuriora in plenisque casibus fieri vix potest. Item ubi Febbris conjuncta typum aliquem, h. e. status exacerbationes & remissiones observat.

8.) Si malum in abdomine herere suspicio sit, V. S. on Clyster commodè præmittatur.

9.) Alvum in omnibus Febribus inflammatoriis, aut quibuslibet acutis fortius irritare non licet, expedire verò convenit. Abstinentum itaque a fortioribus purgantibus, imò & Clysteribus acrioribus. Melius officium faciunt lenissima humectantia & Dosa.

10.) Sub metu suppurationis, aut, ubi motus inflammatorius copiosior necessarius videtur, anodyna minus providè, aut intemperantius adhibita sphacelationem inducunt.

11.) Cam-

11.) Camphorata uti externo usui laudabilem operam navant resolvendo & discutiendo; ita interne adhibita, sanguinem nimis exagitant, æstum & ardorem augent, neque tamen ad ipsam statim discutiendam & resolvendam mukum faciunt.

12.) Idem de myrrhat & aliis Gummi-Resinis acrioribus monendum.

13.) Camphora etiam maturantibus, & suppurationem promovenitibus non inconsulte additur, ne inter suppurandum affluxus humorum nimis dolorem exasperet.

14.) Inflammationes Erysipelacæ turgidiores non solis camphoratis, sanguinem discutiuntibus sunt tractandæ; sed simul serum succulentia, & totum partis restituentia adhibenda. Alias citò quidem dolor & rubor evanescit, remanet tamen tumor veluti cedematosus discutioni valde refractarius. Præstat itaque Vni Camphoratis crocatus, aut Pulvis ex Rad. Iridis flor. Farina feculina, vel Fabarum, cum aliqua portione Cerussæ & momento Camphoræ,

## VARIOLIS &amp; MORBILLIS.

*Nota* hic sunt.

## I. Signa.

## a) Imminentium.

- 1.) Invadunt communiter sine horrore & frigore notabili.
- 2.) Cooritur potius, furtim quasi languor & calor præternaturalis, sæpe tamen satis levis, cum capitis magis gravativa & vertiginosa perturbatione, quam notabili dolore, nec non fastidio ciborum, in specie apud multos, panis.
- 3.) Concurrunt apud piosque tussis & pectoris quidam infarctus.
- 4.) Accedit dorsi tensivus, & levis compunctivus sensus.
- 5.) Multis teneriora eveniunt tormina abdominis.
- 6.) Imò actuales Convulsiones, quæ proximè ante eruptionem, emicant: adeo, ut Baglivius in Praxi L. 1. C. 9. p. 64. motus convulsivos puerorum, Variolas nondum expertorum febribus supervenientes, pro infallibili variolarum eruptioni proximarum indicio habeat.

## b) Præsentium signum certissimum est eruptio post tertium diem contingens

- 1.) In Variolis quidem pustularum, quæ primo rubent, & semen Mili vix superant, sensim vero auferunt. circa diem septimum suppurascunt, cum ambiente Circulo rubente, & inflammatione turgida cutis, imprimis in facie & manibus; circa Undecimum, rupturam puris-

que

que effusionem subeunt, & circa decimum quartum exsiccari ac delabi incipiunt;

- 2.) In Morbillis verò macularum rubicundarum, & leviter protuberantium; quæ sensim spontè cum aliquali pruritu, evanescent, atque in squamulas sive furfures abeunt.

## II. Differentia.

- 1.) Variolæ æquè ac Morbilli quotannis ferè variant, pro diversa constitutione epidemica aëris; atque hoc respectu sunt vel

a) Regulares & benigniores, vel

b) Irregulares & maligniores,

- 2.) Variolæ sunt ratione numeri:

a) Distinctæ, sive paucæ;

b) Confluentes, sive copiosæ.

## III. Subjectum.

Plerique homines semel dum vivunt, aliqui etiam his Variolis & Morbillis corripitur observantur.

## IV. Prognosis.

- 1.) Variolæ generatim c. Morbillis collatæ, quovis respectu periculosiores censendæ.

- 2.) Variolæ confluentes semper majus quam distinctæ periculum minantur.

- 3.) Semper tolerabilius cedunt infantibus quam adultis, & minus succulentis, quam valde talibus.

- 4.) Diarrhoea: præf. terminosa, vel a medicamentis, l. refrigerio extirporum contraria, c. retrocessione Exanthematum aut Variolarum subsidencia, livore in ambitu, pallore reliquæ cutis, conjuncta; plerumque funesta est.

- 5.) A. Morbillorum tamen retrocessione, aut Diarrhoea his contingente, tam certum mortis periculum non est, quam a Variolis retrocedentibus.

K ;

6.) Va

- 6.) Variolarum post eruptionem successiva elevatio, si debiro tempore non succedat, areolæ circa pustulas pallescant, aut livefant, ipsæ pustulæ sessiles, & in medio depressæ, conspiciantur, aut mature subsideant & dehiscant, ac loco puris stigma sanguineo-nigricans exhibeant, utpl. sinefusus exitus sequitur.
- 7.) Idem etiam censendum, si pramaturè, tum nimis copiosæ, tum inconstantes efflorescant, ita ut mox emergant, mox iterum delitescant.
- 8.) Suppurationis status plerumque novam veluti febrem inflammatoriam affert, & plerumque gravius, quam ipsam eruptionis tempus periculum minatur: adeo, ut ægri non raro in morbi declinatione, ubi jam prima febris victa videbatur, ex hac nova febre moriantur.
- 9.) Plures moriuntur ob variolarum copiam, pauci ob earundem inopiam.
- 10.) Melius est, si in principio, & ante eruptionem, symptomata graviora, v. g. Convulsiones compareant, modò post eruptionem mitescant, quam si eidem jam peractæ superveniant.
- 11.) Inflammatio faciei & manuum suppurationis tempore expectanda, si non succedat, aut justò mutarius evanescat, gravè periculum minatur.
- 12.) In sanguine è Venâ secta emissio, si crusta alba, magna, crassaque (qualis in omnibus inflammatoriis morbis observatur) in superficie appareat, variolas fore copiosas & valde periculosas Baglivius prædicit.
- 13.) Invasio c. horrore deterioris quoque ominis est, & status graviter inflammatorii metum incutit.

V. Methodus medendi.

- 1.) Iustum tempus secretionis & eruptionis circumspicere.

observetur, nec unquam in tempestive, vel medicamentis, vel regimine calidiore, incitetur.

- a.) Tutissimus totum usus est absorbentium ostracodermatum, c. ð. diaph. tenerioribus, commodissimè in forma potiusculæ c. Vis diaph. exhibendorum. Pro paulò adultioribus etiam ① addi, & blanda & da, v. g. succus citri c. ⑦. c. citrata, quod Waldschmidii Arcanum fuisse dicitur.

Tinctura Fl. Bellid. Aquileg. Violar. &c. interponi possunt. Potus ordinarius esto. Decoct. C. C. & Rasur. Ebor. c. Rad. Scorzon.

- 3.) Si metus & ipsa jam præludia motuum convulsivorum concurrant, jungatur modo laudatis pulveribus aliquid Cinnab. & Lumb. ⑦ stas, v. g.

R. Conchar. præparat.

ð. diaph. aa. gr. iv. viij. ③ß.

Lumbr. ⑦. gr. j. ij. iij.

Æris gr. ③ ad j. M. F. ③ subtilissimus.

- 4.) Præsente tempore debiro eruptio promoveatur leni regimine diaph. & continentia quiete; ut & per emulsionem Aquileg. Card. B. Napi. l. Raparum tosto, aut ⑦ fervida macerato, c. ⑦ Fl. Tilie, Samb. Scord. Card. B. Ulmar. &c. exclusa tamen ⑦ sumar.
- 5.) Sub ipsa maturatione his ipsis, tñm absorbentibus, diaph. Vis. aut ⑦osis, l. pro adultis & valde ætuantibus, tñm emulsionibus, insistentibus, quibus commodè aliquid sem. Papav. alb. additur.
- 6.) Factà maturatione, imò etiam ruptione pustularum, crustarum remotio, non violenta frictione & abrasione, neque etiam emolliatione per humidam aquam tentetur, d. l. spontanea exsiccatio & secessio expectetur, l. ②. Ovorum, c. tantillo Camphoræ alteratissime,

sumetur, l. Linimentum à Baglivio commendatum adhibeatur.

R.  $\frac{\circ}{\circ}$  Amygdal. dulc.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Sperm. Cet.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Oli. Stillat. L. Rhod. gut. iv. M. F. Unguent.

- 7.) Post plenariam exsiccationem, primæ viæ per laxans sile blandè expurgentur atq; usus alexipharmacorum bis de die continuetur: patiens quoque non nimis citò libero aëri, multo minus frigido, sese exponat, præf. si paulo gravius & durius decubuerit.
- 8.) Suppurationis tempore si inflammatio illa habitus corporis, legitimæ supurationis comes & index, emaneat, partes verò justo diutius palleant: ibi magis necessaria sunt & Diaph. & Alexiph. etiam ipsa myrrhata dosibus minoribus, d. eò sæpius repetitis. Idem quoque in retrocessione variolarum tenendum.

#### VI. Observationes & cautelæ practicæ.

- 1.) Morbus hic, si placidè, leniter, & ordinatè procedat, atque decurrat; præstat Medicum spectatorem magis gerere, quam nimis officiosum actorem.
- 2.) Florimum hic potest calor temperatus, æqualis, & quieta corporis continentia.
- 3.) Regimen æstuosum absit, refrigeratio tamen æqualis, etiam partialis, studiosè tantum vitetur. Sequitur enim hanc sæpe universalis retrocessio exanthematum c. præsentissimo periculo.
- 4.) Irritatio alvi quoque sollicitè vitetur, quantumcumque etiam consuetam alias segnitiam excedat.
- 5.) Quodsi tamen Diarrhœa, præf. torminosa, superveniat, solent Practici ad unum fere omnes ad adstringentia aut anodyna c. alexipharmacis sociata v. g. Theriac. Androm. Theriac. Coelest. Diaph. ord. Fracastor. confugere. Tutior tamen & præsentior (nisi qui-

quidem nimis jam invaluerit Diarrhœa,) est effectus Qi. ad gr. ij. iv. vj. c. absorb. aliquo, & paucò vehiculo, exhibiti.

- 6.) Mediæ suppurationi variolarum, si defectiones aliquot purulentæ superveniant, non debet Medicus iis terri, & ad usum adstringentium confugere; modo non cito & sæpe se invicem sequantur, aut insigni conatu nihil effectui dignum educant. Tunc enim & his prospicere decet.
- 7.) Faciem à variolis præservare plerumque incerti est eventus.
- 8.) Fauces optimè præservantur per extrinsecam colli obfectionem studiosam: potest etiam aliquid appensio Camphoræ. Convenit quoque linctum ex syrup. Violarum & Diamor. aa, aut, si jam pustulæ fauces internè obfideant, gargarisma ex Decocto cremoris Avenæ tenuiori, cujus Mensuræ semis Qi  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$  addi potest.
- 9.) Ne oculi nimia variolarum copia obruantur, præmuniri possunt sequenti Collyrio.

R.  $\nabla$ . ros.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Ess. Croc.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Sacch.  $\mathfrak{h}$ , gr. vj. M. quod circumferentias oculorum sæpius illinendum.

- 10.) Quodsi verò in confluentibus, tempore suppurationis, accedente vehementiore inflammatione faciei, palpebræ coalescant, (quod vocant dießugen sind zula geschworen) Naturæ committatur negot. sæpe enim hi, qui vixit j. duram jam subisse credebantur, post spontaneam crustarum secessionem illæ fos afferunt oculos.
- 11.) In Vanolis que lentè erumpunt, ut alius mutarè cessantibus sensim alie recens succedant, maxime cavendum, ne acri notabili euphoria post potorem quantitate consumptam, licetiores facti, reliquum malè administrando, convalescentes & mortem incurant.



De

# FE BR I B U S , Quarum Indoles ac species nondum satis est perspecta.

*Hæc.*I. *Dignotio* qualiscunque desumitur ab

- 1.) Invasione modo & tempore diverso;
- 2.) Symptomatum indole & varietate;
- 3.) Paroxysmorum plus minus statō circuitu;
- 4.) Etatis, sexus, temperamenti, morborum prægressorum vel epidemicæ jam grassantium, diversitate.

II. *Tractatio* therapeutica seqq. nititur regulis:

- 1.) In febribus, aut insultibus potius febrilibus, quorum typus atque genus nondum satis est cognitus, præstat ab omnibus præscriptibus medicationibus, methodis, & regiminibus abstinere, quæ universum febris decursum perturbare possent, h. e. Vomitus, Purgantia, V. S. sudorifera fortiora non adhibeantur, nisi manifestissimæ adfuerint indicationes, horum aliquid efflagitantes.
- 2.) Tunc est primis diebus nudis absorb., diaphor. fixis, & temperantibus Ovis insistere, interpositis lenioribus, & minimis quasi dosibus, Alexipharmacis alicujus temperationis, impr. si calor jam sponte non sit ingens, aut Vis diapnoicis gravioribus, præf. in subjectis junioribus, ubi sudorifera calidiora omni modo exulare debent.

3.) Quan-

3.) Quando verò febrilis affectus, præfert. in adultioribus, qualemcunque typum servat, debet cum Medicis curiosè & sollicitè animadvertere, quo diei vel noctis tempore affectus sensibiliorem exacerbationem habeat. d. i. Um welche Zeit der Patient stärker oder leichter sey? Igitur versus tempus illud, quo talis exacerbatio sentitur, absorbentia & diaphoretica fixa cum Ovis exhibeat, & illis insistas, reliqua diapnoica liquida interponendo; mitescens verò paroxysmi impetu, lenia alexipharmaca adhibeat, usque ad illud tempus, quo novus paroxysmi insultus eripiat, ubi iterum antecedentia medicamenta repetenda sunt.

4.) Quod si verò levis clandestinus calor, interim tamen ingens virium dejectio, & lassitudo subsit, in tali casu præstat ab alexipharmacis acrioribus abstinere, & nil, nisi absorbentia, cum diapnoicis mixtata, in ulum trahere.

L. 3

TAB. XIII

## DYSENTERIA.

Notanda hic sunt:

## I. Signa. Est enim

- 1.) Fluxus alvi valde frequens & stimulans, cum exquisitis torminibus conjunctus, quemque sensim sanguinis subruenta mucida substantia, ac si interiora intestinorum abrasa effluerent, insequitur.
- 2.) A medio Julii usque ad Septembris medium grassans.
- 3.) Contagiosus, imò sæpè pestilens.
- 4.) A fructuum horreorum ingurgitatione coarctans, sæpè etiã solo contagio communicabilis.
- 5.) Plerumque cum symptomatibus febrilibus, imprimis verò appetitus & virium prostratione, æstu præternaturali, siti, &c. complicatus.
- 6.) Ut plurimum molestissimo tenesmo, sæpè etiã proclivencia ani in progressu & declinatione morbi sita.

## II. Subjæctum.

Invadit omnis ætatis & sexus homines, imò corpora aliàs evidenter sana, & sanguine floridiore, impr. simul abundantioribus instructa, quæ præ reliquis gravius exercet.

## III. Differentia.

- 1.) Ab aliis alvi fluxibus, quod patet
  - a.) Ex epidemica certo anni tempore grassatione.
  - b.) Ex torminum & reliquorum symptomatum ferocia.
  - c.) Ex excretorum subruenta & mucida consistentia, tunicæ interioris villosæ intestinorum abrasionem referente.

2.) A flu-

- 2.) A fluxu hæmorrhoidali, impeditius, & c. torminibus sensibilibus emicante, in eo præc. differt, quod in hoc sanguinis excretio augescens morbi & præc. torminum impetum minuat; in dysenteria verò exasperet.

## IV. Prognosis.

- 1.) Durat ad 3. 4. 5. septimanas.
- 2.) Spontè difficulter & rarò cessat; facile verò & sæpè patientem jugulat.
- 3.) Quo vehementior commotio febrilis concurrit, eo gravius & periculosius est totum malum.
- 4.) Gravius plerumque decumbunt, impr. verò magis præcipiti virium prostratione, & evidentiori febrilis commotionis concursu, infestantur, qui ex nudo contagio, quam, qui ex fructuum horreorum abusu hoc morbo corripiuntur.
- 5.) Repeatè conquiescentia tormina, sine reliqua virium, & imprimis animi alacritatis sinceræ, conspersione, h. e., nisi aliis Euphoricæ signis; ut & superveniens aphthodes inflammatio faucium, pessimi & plerumque funesti ominis sunt.
- 6.) Violentioribus adstringentibus suppressus aut cohibitus fluxus, gravissimas angustias, vomitus, imò non rarò convulsiones & præcitem lethalem exitum post se trahit.
- 7.) Vomitus maturè, & per ipsa initia accedens, mitigat universi morbi ferociam, imò post fructuum horreorum ingurgitationem immediate, & priusquam alvus turberetur, contingens, ac sufficiente quidem quantitate procedens, toti malo præoccupando interfert: Tardius verò superveniens & vacuus, sive irritus potius vomendi conatus, altioris læsionis in ipso ventriculo prævalescens signum est.

L. 3.

g. Com.

- 8.) Communiter longe pejore est incruenta Dysenteria, vulgò alba dicta, quam cruenta: certissime verò nimio pejor, quando cruentatio desit, reliqua vero symptomata augeantur.
- 9.) Appetitus prostratio ultra 9. dies si perseveret, aut, si post dejectiones nigras, vel vomitus nigros, appetitus non redeat, periculosum est; Contra verò, ubi post tales excretiones appetitus redit, c. somno, & aliquali remissione doloris; sæpe etiam ægrotantes convalescunt. vid. Petermannus.
- 10.) Si in Dysenteria adhibueris Opiata, & altero mane color oculorum ægri est mutatus; certè non superabit morbum. Si verò color oculorum non mutatus visitur; indicio est, ægrotum posse reconvallescere. Waldschmid.
- 11.) Deglutita potulenta si cum resonitu ventriculum illabantur (Germ. vocant *Sülsten*) Paralyfin musculorum Oesophagi indicant, adeoque ut plurimum mortis instantis sunt prodromi.

#### V. Remedia

- 1.) Abstergentia & evacuantia, Rhab. in substantia datum, vel in infuso saturatiore, Pil. Polychr. Beccheri, vel Balsamica Stahlianæ. Clysteres ex sero lactis, vel Decocto furfur. tritici.
- 2.) Humores acres biliosos fermentescentes temperantia & obtundentia Absorbentia, Crystall. montana præparata, Corall. præparata &c.  $\Phi$ . Gum. Arab. Lac  $\nabla$ a largius dilutum,  $\phi$ . Amygd. dulc. vel Lini, Vitelli ovorum in jusculis, Decocta gelatinosa ex ras. Ebor. C. C. Rad. Scorz. Clyster. ex Lacte, aut ex Decocto Fl. Verbasc. Sambuc. Linariæ parati c. pluribus vitellis ovorum & Thereb. in his soluta.
- 3.) Dolorificas fibrarum intestinalium convulsiones demul.

mulcentia, Anodyna, Theriaca Androm. Ther. coelest. MP. de Cynogl. Pil. Wildeg. Pil. Antidysf. Waldschmidii, Laudan. Cydoniarum Langelotti, item Carminativa, v. g. Decoct. sem. Carvi calide haustum, tandem sacculi, Fomenta, Cataplasmata, Linimenta & Epithemata calida ac nervina, v. g. Bals. Scherzerian. umbilico & scrobiculo cordis innactum, v. camphoratus c. linreis toti abdomini impositus, Euphr. de crustapanis c.  $\phi$ . St. Maris & Menthae vel stomachico Craton. malaxatum, & regioni epigastriacæ atque umbilicali applicitum, sacculo calente ex avena ustulata desuper imposito.

- 4.) Miasmata maligna sanguini insinuata eliminantia; Alexiph. v. g. rad. Gent. rubr. Pimp. alb. Angelic. Caryophyllat. Hb. Scord. Millefol. sem. Santonic. Tanaceri &c. regimen insuper diapaëticum assiduum.
- 5.) Tonum ventriculi & intestinorum roborantia: Vinum generosum, Tragacæ stomachicæ ex frusto panis similagine: tosto, pulvere aromatico consperso, & Vino Hungarico vel Canariensi irrorato. item fructus Sorbi majoris exsiccati, Miva Cydoniorum, & alia Cydoniata, item Cinamomum masticatum & deglutitum.
- 6.) Specifica: Hepar Serp. Priapus Cervi, Smaragd. præparata, Cruor Lepor. exsiccat. & quæ nuperus tamam affecuta sunt rad. specacuanæ, & Cortex Chaquarillæ.

#### VI. Methodus medendi.

- 1.) Si crassa aliqua materialis corruptio & colliquies humorum ex abusu fructuum horraorum vel diætae alias incondita, in primis viis hæreere suspicio sit, quanto citius ea eliminanda est.

2.) Sub-

- 2.) Subtiliora verò valde corruptiva & fermentativa, imò vere maligna miasmata, uti jam Natura ipsa per concurrentem febriū eliminare satagit: ita juvetur medicamentis temperatioribus Alex. v. g. Ess. Alexiph. c. Ess. Gentian. iūm continentia quæta & moderata obiectiōe, ac velut ad sudorem compositione, non tūm aq̃e actuali forte regimine sudorifico.
- 3.) Mane itaque detur lene Catharticum, v. g. ꝯ Rhab. electi ꝯi. 3ꝯ.
- 4.) Vesperī subungatur usus Anodynī alicujus selectioris, v. g. Theric. Androm. ꝯi. idque ad mentem Sydenhami etiam postero die repetatur. Vel exhibeantur mane Pil. Balsam. & binæ doses pulveris Chaquar. ꝯi. idque eodem die adhuc semel repetatur. Proximo die denuo dosis Pil. Balsam. & binæ doses pulveris Chaquar. assumantur. Quod raro ultra tertiam vicem repetendum erit.
- 5.) Mitescente sensim dolorum ferocia, dejectionumque frequentia, ac redeuntibus paulatim viribus, potest ad roborandum ventriculū leniū subadstringentium ex forbis vel cydoniis usus esse, non tamen absoluta necessitas.

## VII. Cautela Practicæ.

- 1.) Vomitorium adhibere si consultum videatur, fiat hoc viribus constantibus, in initio morbi, & ubi iusta cruditas in ventriculo hospitantium suspicio subest.
- 2.) Pertinet huc etiam Specificum istud decantatum rad. Ipecac. quod non solum pro hac intentione, d. etiam in allegatis circumstantiis commodissimè datur. Contra verò in malo provectiori, & præf. ubi febris inflammatoria jam valde invaluit, raro voto & expectationi satisfacit.
- 3.) Inter purgantia Scammoniata & Aloëtica, præprimis largiora exulent.

4.) Ano-

- 4.) Anodyna sive Opiata non adhibeantur, nisi viribus nondum exhaustis, c. Alexiph., sive lenibus diaphoreticis iuncta, & potissimum circa tempus consuetum somni.
- 5.) Adstringentia in malo, mox à primo impetu graviore, & ultra maledicam causam, ex nudo contagio coorto, aut alius jam radicato, præpr. verò febris evidenter stipato, certissimè noxia, imò in hoc morbo plane non sunt necessaria.
- 6.) Egrotus ob frequenter surgendi necessitatem, & hinc refrigerationis facilitatem occasionem, vestimentis laxioribus, (mit einen Schlastock) & tibialibus indutus, decumbat. Sella foricaria & calida supponatur.
- 7.) Omnis refrigeratio nocet, & exasperat malum. Calor, si minus totum malum directè, certe tamen impetum ejus minuit & mitigat.
- 8.) Quæta continentia corporis lenit & placat; agitatio auget incommoda.
- 9.) Potus quilibet fovet ad minimum, communissime verò exasperat malum, idque tanto certius, quo magis frigidus.
- 10.) Præstat tamen legitimo febris complicatæ decursus per sufficientis potus subministrationem, etiam c. aliquali fluxus præjudicio consulere, quàm cum febris præjudicio fluxui per adstringentia obistere.
- 11.) Moderatè s potus Vini, imprimis generosioris, morbo huic non modo non obesse, sed familiariter prodesse observatur.
- 12.) Osa c. absorbentibus data non solum sine damno, d. & cum eximio levamine inter initia exhiberi possunt; at verò in malo provectiore & graviore, ubi non injustè decretionis intestinorum præsentis suspicio adest, præstat iis abstinuisse.

M. TAB. XIII.



## HÆMORRHAGIA NARIUM.

*Hæmorrhagiæ narium notanda veniunt*

I. *Signa fluxus*

*Imminentis*: Congestiones versus superiora, & hinc in partibus remotioribus, alvi adstrictio, urina tenuior, hypochondriorum coarctatio spastica, circa partem affectam vero, rubor genarum, inflatio vasorum temporalium, dolor capitis non tam exquisitus punctorius, quam gravativus, dolor oculorum gravativus, imò compunctorius.

II. *Differentia*:1.) *Alia*

a.) *Est Chronica.* & homines de reliquo sanos affligit; alia

b.) *Morbis acutis supervenit,* & hæc est vel Critica vel symptomat.

2.) *Utraque est vel*

a.) *Tolerabilis & innoxia:*

b.) *Excessiva, nimis frequens & vehemens, aut in Crisibus nimis parca.*

III. *Subjectum.*

1.) *Hæmorrhagiis narium familiaris* exposita est ætās puerilis & adolescentilis ab anno IX. usque ad XII X. imò XX. circiter.

2.) *Pariter tamen & adulti, in juventute frequentius* hæmorrhagias experti, postmodum vero per evacuationes vicarias, & aliis locis institutas inde sublevati; his vero jam destituti, facile post liminiò hæmorrhagiis narium corripuntur.

g.) *Fa-*

3.) *Facilius quoque Hæmorrhagiæ Nar. eveniunt* hominibus, qui sunt temperam. sanguinei, aut c. sanguineo prædominante mixti, item qui post potum paulo spirituosiores, tum motu corporis rubore faciei suffunduntur, tum debilitate capitis tentantur.

IV. *Prognosis.*

1.) *Hæmorrhagiæ narium bene procedentes, non nimis crebræ, neque excedentes, non tantum sublevant* subjectum plethoricum, sed etiam in perfecta Crisi patientem restitunt.

2.) *Nimis autem enervant Patientem, in Cachexiam, Hydropem, Tabem, imò mortem non raro præsentaneam præcipitant.*

3.) *Prognosticum vulgi, pueros frequentioribus narium hæmorrhagiis obnoxios, in phthisin pronos esse* pronunciantis, sæpe ipso eventu comprobatur, partim quia violenta hæmorrhagiarum ejusdm. peradstringentia imprimis interna oppressio, obstipationem viscerum inducere solet; partim quia, sponte cessantibus per ætatem, hæmorrhagiis narium, impetus sanguinis ad pectus & pulmones ruit.

4.) *Hæmorrh. nar. in provectioribus semper periculosiores, & majori circumspectione tractandæ sunt, quam in junioribus.*

V. *Remedia.*

1.) *Divergentia: extra parox. tempestiva* Ventilat. sanguinis, it. blandæ laxationes, apertio hæmorrhoidum, & promotio fluxus menstrui.

2.) *Temperantia: Osa, acidula, emulsiva & gelatinosa, v. g. ꝯ Antispasm. Tinct. Fl. Bellid. vel Papav. errat. Decoct. C. C. Lrasur. Eboris.*

3.) *Anodyna: MP. d. Cynogl. ad gr. j. li. pulveribus Cinab. addita.*

M 2

4.) *Le-*

4.) *Leviter adstringentia*: Corall. species de Hysc. Smaragd. preparata.

5.) *Topica*: Stercus suillum, calidum naribus oblatum; turunda ex Oine naribus immissa. Solutio Sacch. Sat. iisdem injecta, foligo tenerior insufflata, rad. pleu. acor. sub lingua detenta.

6.) *Sympathetica*: Busto exsiccatum sub axillis gestatus, aut in manu detentus, Lignum fraxini circa Ostrium cæsum, & fronti sursum versus affricatum, aut in manibus detentum, sanguinis exsufflantis exceptio pulvere sympathetico Dygæano, aut ferro ignito tacta.

#### VI. Methodus medendi c. Cautelis Practicis.

1.) *Hæmorrhagiæ* nar. non immodicæ, non nimium frequentes, sanguinem etiam bonæ notæ & satis floridum exhibentes, in ætate adhuc juniore præf. sensibili, plethoræ, & præf. insuper adhuc terro. aularum occasional. incitamenta expectantes, nulli in se sibiilem fatigationem, sed sublationem potius post se trahentes, imò prægræssam qualemunque gravitatem, tensionem, cephalalgiam, sensibilibus solvantes, nequaquam curandæ sive supprimendæ, sed potius tolerandæ sunt.

2.) Sufficit in ejusmodi casu diætam convenientem, sc. sufficientem potum, placidum morum, abstinentiam ab æstuosis cibis & portionibus, evitacionem æstus ambientis, successum reliquarum debitari excretionum. Animi etiam pathematum moderamen injungere.

3.) Quando verò hæmorrh. vel frequentiores, vel copiosiores eveniunt; vel ob leves, præf. magis evitandas, & sæpe occurrentes, causas occasionales, prorumpunt, ætas insuper jam adultior, adeoque artificialibus evacuationibus commodior, præsto est; ibi & securum, & certum remedium præbet V. S., commodo tem-

pore

pore, verno, vel autumnali, vel pro re nata, utroque instituta, & postea anniverfariis istis periodis continuanda.

4.) In ætate verò teneriore, & concurrente, ut plerumque fit, *Dyscrasia sanguinis*; sufficit diætam congruam ordinare, successum alvi promovere, sanguinis nimie tenuitati & mobilitati per temperantiam & demulcentia, visciditati ejusdem per antiscorbut. temperatiora occurrere.

5.) *Adstringentibus* verò insolentioribus tales hæmorrhagias præoccupare, neq; integrum, neq; tutum est.

6.) *Adstringent. præf. interne* data, nullibi minoris sunt efficaciæ, quam hoc loco.

7.) Plus fere præstant extrinsecus applicita: nunquam tamen adhibenda; nisi verè urgente necessitate, & sub junctis discutientibus, sive diaphoreticis temperatis.

8.) Cautissime vero usurpanda sunt *adstring.* in hæmorrhagiis criticis, sive quæ morbis acutis superveniunt; Utar enim illæ modum excedant, vix tamen tantum & tam certum periculum inde metuendum, ob sanguinis jacturam per ipsum fluxum tactam, quam ob viscerum indurationem scirrholam per adstringentia inductam.

9.) In acipiti tali casu præstat summam negotii naturæ committere, atque temperantibus, tonicis, & analepticis insistere, neque ultra Corallia, Species de Hysc. Marg. Orient. Smaragd. preparat. aut lenia anodyna, ligaturæ extremorum, applicationem V. camph. crocati circa verticem & tempora, progredi.

10.) Viribus per nimiam hæmorrhag. dejectis per analeptica, non nimis tamen acris, & parvis d. repetitis dosibus exhibita, sive currendum, ab opiativis vero abstinendum.

11.) Post enormes hæmorrh. nar. superatæ corpusc. tùm à frigore tùm ab æstu nimio defendat, oculis etiam parcat Patiens.

## HÆMOPTYSI.

*Hæmoptyses notanda sunt.*

I. *Signa*

- a.) Imminentis: spasticæ compressiones scapularum, & humerorum, angustix, aut titillationis sensus in profundioribus faucium.
- ß.) Præsentis: exspuitio, sive egestio sanguinis per os floridi & spumidi in aliqua copia notabili, c. l. sine tussi præcedente, nunquam tamen absque eadem comitante contingens.

II. *Subjæctum.*

Hæmoptyses periculo familiarius exponuntur

- 1.) Juvenes ab anno XX. ad XXXV. circiter.
- 2.) Homines temperamenti Chol. Sanguinei, aut sanguineo-melanch. staturæ proceræ, habitus gracilioris.
- 3.) Personæ, quibus necessitas multum c. contentione vocis loquendi, cantandi, incumbit &c. aut saltationibus, & similibus motibus repentinis indulgentes, it. quibus a motu corporis citiori, & præcipiti, mox valde angustatur respiratio, c. intercurrente irritatione quadam tussiculosa.

III. *Prognosis.*

- 1.) Hæmoptysis omnium hæmorrh. est periculosissima & maxime fontica; si non statim in præsentī lethifera, imposterum tamen exitus funestī periculum, h. e. phthiseos, ulcerisque, & nodosæ indurationis pulmonum metum inducens.

2.) Quæ

- 2.) Quæ tamen periodicæ, & statim veluti temporibus recurrit, nullam quoque tussim, aut dyspnœam suspectam post se relinquit, magis quidem periculosa, curationi tamen maxime refractaria existit.

IV. *Therapia.*a.) *Curatoria:*

- 1.) Nimii sanguinis ad pectus ruentis diversio per V. S. revulsoriam, in pedibus institutam, per ligaturas extremorum, item per foras calidos, manibus, & impr. quidem plantis pedum applicandos.
- 2.) Orgasmi sanguinis sedatio per Osa & Cinnab. quibus gr. i. vel ij. MP. de Cynogl. casu magis urgente, addi potest.
- 3.) Ipsi eruptionis violentioris cohibitio per adstringentia, v. g. Crocum & Zialem ad gr. vj. l. viij. c. MP. de Cynogl. gr. j. exhibitum, per ꝯ Heurnii contra Hæmopyrin, qui talis est: R. sem. Hyoscyam. ꝯj. Lap. Hæmatit. ꝯss. Corall. rub. ꝯj. sem. Papav. ꝯss. M. F. ꝯ. Oerur c. Conserv. ros. vid. Heurn. Comm. in Aphor. Hipp. L. V. Aph. i. it. per pulverem sympather. Dyghæanum in V. dissolut., cui dein sanguis egestus immittitur.
- 4.) Aequalis sanguinis per totum habitum corporis distributio per diaphoretica temperata, v. g. Dolin moderatam Ess. Alexipharmacæ, aut, si quid febrilis, uti non raro contingit, subit, per potiunculas diaphoreticas c. ꝯio diaph.
- 5.) Sanguinis forte congruati resolutio & pulmonum restauratio per Decocta pectoralia leniter abstergentia, non manifestò adstringentia, aut nimis dulcia, v. g. ex Fl. Bellid. pratensis. Hb. Agrim. Veron. Urt. min. Heder. ꝯr. Rad. Pimp. alb. Helen. Liquore CC. l. Eboris parata.

ß.) *Præ-*

## 8.) Præservatoria per

- 1.) V. S. autumnalem & vernam, imò & scarificationes præf. in affuetis.
- 2.) Mixturem ex Tinct. Querc. & al. C. C. &c.
- 3.) Apertionem & promotionem fluxus hui & hæmorrhoidalis, caute tamen instituendam, ne universalis sanguinis Orgasmus & novus ad pectus affluxus concitetur.

## V. Observationes &amp; Cautela præctica.

- 1.) Excretiones sanguinis per pulmones omnium esse periculosissimas, adeoque quantocius sistendam, consentiunt omnes præctici; de modo tamen atque medus dissentiunt, dum alii adstringentia, alii opiata, alii V. S. suadent.
- 2.) Sicuti autem in aliis quoq; hæmorrhagiis, per loca magis periculosa erumpentibus, repentina per adstringentia fluxus suppressio fontica damna infert; ita multo magis talis violenta hæmoptysæ cohibitio aut hæcticam ex conspitatione Hepatis, aut Pleuritidis strictæ dictam, ex cruoris retenti putredine, prognotam, inducit.
- 3.) Opiata sæpius quoq; effectu desiderati hic destituuntur; imò ipsi quoque eorum Patroni cautelam, ex infausta procul dubio experientia subnatam, addunt: Opiata pectori esse inimica.
- 4.) V. S. in ipso vigore parox. nihil juvat, nisi copiosa sit, emissio parior potius exacerbare videtur affectum.
- 5.) ☉ cum absorb. aut diaphoreticis & Cinnab. junctum, omnibus his palam præcipit, dum non solum satis præter (3. vel 4. dosibus) eruptionem sanguinis cohibet; d. & tutissimè & tranquille sine omni angustia & oppressione pectoris residua hoc præstat.

6.) in

6.) In malo tamén urgentiori non semper satisfacit.

7.) Hinc possunt tum addi anodyna & subadstringentia, v. g. Species de Hyacinth. & MP. de Cynogl. imò in casu necessitatis ad positivè adstringentia confugiendum.

8.) Pulvis Dygbsæ sympathet. f. ☉ lum in radiis ☉ aribus calcinatum, si ejus circiter. ʒj. in ☐. com. ʒj. dissolutum patienti pro excipiendo sputo sanguinolento offeratur, ipsique, ut ☐ am hanc subinde baculo ligneo agitet, injungatur, aliquoties sensibilem opem attulit, dum non solum fluxum maxime impetuosum efficaciter cohibuit, d. & in futurum constanter compescuit.

9.) MR. supra laudata tonico diuretica ex ☐ C. C. & Tinct. ☐. p. æq. remissa non tam præservative ad recursum mali præoccupandum, sed etiam curative, in paroxysmo leniore, pertinaciter tamen recrudescente, tuto, imò c. fructu ad gutt. XXX. bis, l. 2. de die exhiberi potest. Non enim æque humores alterat, (ut vulgo creditur) sed potius tonum partium solidarum roborat. Conf. Diss. Stahl. de Hæmoptysi. §. 37. item Hoffm. de Tract. Præct. Hæmorrh. pag. 12.



## VOMITU-CRUENTO.

*Vomitum Cruentum notanda sunt:*

### I. Signa

a.) Imminētis: Spasmodica & cordialgica pathemata circa praeordia & hypochondria, impr. in latere sinistro, non perpetua & stataria, d. per intervalla, imò statas interdum periodos recrudescentia.

β.) Praesentis: Egestiones sanguinis, utpl. nigricantis, & congruati per vomitum, interdum à vomibunda torsione & reiectione ciborum incipientes, tandem verò magis sanguinem sincerum excrentes.

### II. Differentiae Vomitus cruentus est l.

a.) Spontaneus, atque utpl. periodicus.

β.) Violentus magis à causis externis, v. g. à purgantibus & emeticis drasticis, à septicis improvide assumptis, proritatus.

### III. Subiectum.

Foeminitis familiarior est hic affectus quam Viris, & utplur. quidem illis evenit, quae fluxos & ataxia, aut plenaria suppressione laborant, aut quibus exes iusto maturius cessarunt.

### IV. Prognosis.

1.) Raro ita copiosus contingit, ut praesens vitae periculum, ob jacturam sanguinis urgeat.

2.) Gravius tamen minatur periculum, si cum rege nullo simul sanguis, & quidem vere floridior rejiciatur. Vid. Forest. L. XVI. Observ. 24.

3.) Minoris periculi est in sexu foemineo, quam virili, ita qui sponte coarctatur, quam qui à causis violentis induci-

ducitur; denique, qui periodicus existit, quam qui incertis intervallis recurrit. Conf. Forest. L. XVI. Obs. 25.

4.) Facile tamen in consuetudinem degenerat, & Cachexiam tandem inducit.

5.) Idque tanto certius, quo violentior & copiosior contingit, aut, quando per adstringentia perperam tractatur. Horum enim abusum Cachexia, Oedemata, Hydrops, Haemica, Colica convulsiva, & alia hypochondriaco-spasmodica hysterica pathemata satis effera pressio pede sequuntur.

6.) Vomitus materiae nigricantis instar Rob Sambuci, (quando nihil aliud quam sanguis congruatus,) in Acutis lethale signum; in Chronicis verò post Quartanas, aut hypochondriacas passiones, diutius toleratas, melioris spei.

### V. Remedia

Praeter superius laudata medicamenta specifica, efficacia hic pollet Millef. in forma Ess. Vid. Stahl. Diss. de Motu Tonico Vit. p. II. it. ejusdem Pathol. p. 740. it. 1029. Quodammodo etiam Lap. Manati & Dens Hippopotami in forma gis.

### VI. Methodus medendi c. Caut. Practicis.

1.) in paroxysmo moderatè sistentibus, c. discutientibus junctis, utendum; vix autem ad positive adstringentia progrediendum.

2.) Egrege hic se gerunt ~ urinosi exilissimis dosibus, (ad gutt. 7. 4.) Ess. aliqua Carmin. ex rad. Helen. Pimp. Gentian. rubr. remixti.

3.) Neque plane contemnendae sunt Tin & Corall. c. Cera, aut ~ panis, vel succo Citri paratae.

4.) Externa inhiem usum hic non praestant, nisi quatenus conatum vomitorium in genere sedare dicuntur.

cuntur. Sed vomitus hic minoris considerationis est, imò, quamdiu notabilem quantitatem, aut grumos sanguinis adhuc excerni videmus, non temere sistendus est.

- 5) Alvi adstrictam esse non decet, neque tamen purgantibus internis hic æque locus, minimè omnium Aloë ictus quæ etiam in omnibus eruptionibus sanguinis suspecta sunt; sed præstat Clysteres adhibere lenientes, & Oino stimulo imbutos.
- 6) Post paroxysmum etiam, si quid sanguinis congruam in ventriculo resistere suspicio sit, lenes laxans rhabbarbarum subungere non inconsumum erit.
- 7) Ab adstring. tantò magis cavendum, quando Vomitus cruentus, ut ferè sit, consueta Fluxus menstrui periodo contingit, aut à supressionis Hæmorrhoidum dependet: imò ne specifica quidem superius laudata tunc locum habent.
- 8) Ad præoccupandum recursum paroxysmi V. S. in pede, & Elix. Millef. usus versus initium Fluxus menstrui periodum; aut, ubi Hæmorrhoidum suppreffio subest, hirudinum applicatio suadenda est.
- 9) Tempore intercalari medicamenta Fluxum menstrui & hæmorrhoidalem placidè promoventia ex usu sunt: cavendo saltem, ne per fortiora repellentia Vomitus cruentus revocetur.

## MICTU CRUENTO.

*Mictus cruentus* notanda sunt

I. *Signa.*

- 1.) Imminentis Mictus cruenti signa adeò evidentià non dantur, præter levem tensionem & gravitatem lumborum, aut fatigationem totius corporis. Tacitè enim plerumq; cooritur. Quò verò magis sensibilis dolor conjunctus est, eò justior de Calculi præsentia & concursu suspicio subest.
- 2.) Præsentis signum evidentissimum est ipsa urina non solum cruenta, aut sanguine imbuta, sed larga sæpe quantitate liquidi sanguinis remixta, cui sensim coagulascens, & fundum petenti deinde supermarat,
- 3.) Interdum tamen sanguis jamjam congruatus c. urin. excernitur, & quidem formam vermis alicujus referens, crassitiem verò calami scriptorii æquans, qui procul dubio in ulceribus ita concrevit.

II. *Subj. Sum.*

- 1.) Familiarior est sexui virili, quàm tæminino.
- 2.) Floridiori ætati admodum rarò obtingit, nisi violentia Calculi asperioris, vel impetuosè abrupti, subit, aut casus ab alto, Cantharidum improvidus usus, similesque causæ externæ præcesserint.
- 3.) Spontaneo autem magis exortu evenit senioribus plethoricis, tamen & aliàs floridiorè habitu instructis.
- 4.) Succedit tamen satis sæpe Hæmorrhoidum aliàs consuetarum emanationi, sub diæta interim vinosâ & iracundia familiar., concurrente itidem motu corporis.

succussatorio per equationem vel vesturam, nec non abusu rei quæ.

### III. Prognosis.

- 1.) Effectus hujus evacuationis nullo modo est utilis, quia præponderent incommoda, imò pericula verè fontica.
- 2.) Est enim hoc malum ita obstinatum, ut, nisi maxime tempestive iterum miretcat, & quidem c. vicariæ ventilationis sanguinis prudente subordinatione, contumacissimum, & sensibilibissimum sese gerat, tum ad irregulares erumpendi, tum emanendi, excessus propendens.
- 3.) Qui in mixtum talem cruentum devolvuntur Senes, vix diu supervivunt, nisi quidem admodum commode, atque libere hic fluxus ipsis succedat.
- 4.) Repente si cohibeatur Mictus cruentus, præsertim assuetus, variorum spasticorum, aut tabidorum affectuum, pericula omnino fontica succedunt: Imò, uti in pulmonibus ab Hæmoptysi immediate, solum adstringendo oppressa, ulcerationes remanere solent, ita à Mictu cruento repente confiecto facile ulcerationes renum oriuntur, aut, loco sinceri sanguinis, post hac mucum subcruentum cum urina effundunt.

### IV. Remedia.

- 1.) V. S. revulsoria, etiam paulo largior, in superioribus, sc. manu, vel brachio, instituta.
- 2.) Temperantia & orgasmum sanguinis sedantia: pulveres Ossi, Cinnab. C. MP. de Cynoglossa.
- 3.) Adstringentia: succus Urticæ & Decoct. Equiseti. Vid. Obs. Urat. p. 184. ☉. è minerâ Artis Hassiaca c. ☿ pluviali extractum, atque à magmate, quod ultimum restat, difficulter cristallificabili, & summe austero, crist.

cristallifando segregatum, ac denuò in ☿ resolutum, atque in forma liquida, ad gr̃i pro dosi propinatum.

- 4.) Topica: Unguent. Comitissæ, Infrigid. Galeni, abstinendo tamen à Camphora.
  - 5.) Balsamica, Gummi. Mastich. & Junip. abstinendo ab acrioribus, imò ipso Balsamo Peruv. substituendo potius ea, quæ alias pulmonum exulcerationi destinantur, scilicet H. Hederæ ☿ str. Vincæ pervinæ. Hyperic. impr. verò Virgam auream Gesneri.
- V. Methodus medendi c. cautelis Præcis.
- 1.) Mictus cruentus nullo modo tolerandus est, ut assue fiat, fontica enim minatur pericula, hinc omnino sistendus est.
  - 2.) Id ipsum tamen moderate fiat, præmissis, si nondum ipso fluxu sufficiens sanguinis copia evacuata fuerit, V. Sione revulsoria, & orgasmum sanguinis universallem sedantibus, Ossi & Cinnab. subjuncta quæ in assuetis, aut manifestò plethoricis, V. S. præservatoria in pede, tempore intercalari administrata.
  - 3.) Commodissimè blanda ejusmodi cohibitio præstatur per supra laudatum medicamentum ☿ ale in ☿ solutum, atque ad ʒj. successivis dosibus propinatum.
  - 4.) Alvum semper expeditam esse convenit, id quod optime per Clysters obtinetur.

# FLUXU HÆMORRHOIDALI NIMIO.

*Fluxus hæmorrhoidalis nimis notanda sunt:*

## I. Signa.

Fluxus hæmorrhoid. ille demum censendus est nimius, qui vel justo frequentius, v.g. singulis octiduis recurrit: vel solito diutius, ad duas, tres septimanas, imò fere continuè durat; vel denique nimis largam quantitatem sanguinis eliminat, ita, ut tantum fere singulis dejectionibus egeratur, quantum aliàs larga V. S. educi solet, adeo, ut vires inde notabiliter alterentur, gravitas in coxis, crurum imbecillitas, imò Cachexiæ haud obscura vestigia compareant.

## II. Subiectum.

- 1.) Fluxus hæmorrhoidalis omnibus fere sine discrimine temperamentis evenire solet, impr. post prægressa pathemata hypochondriaca diuturniora, aut concurrente hæreditaria dispositione; imò & contagio, accedente insuper equitatione paulo tortiori, præf. in Sole, vel nisu violentiori expressorio sæcum induratarum, ob alvi violentiorem familiarem: item abusu Aloëticorum & Crocatorum, nominatim v. Elix. Propr. & Pillularum Francos. diætæ acriori aromatica, potu vinorum Austriacorum & Hungaricorum, iracundia frequentiori &c.
- 2.) Junioribus fluxus hæmorrhoidalis propriè sic dictus raro contingit, nisi ab hæreditaria dispositione; evenit verò iisdem aliquando copiosa dejectio sanguinis

nis per inferiora, post diuturnâ pathemata hypochondriaca, quæ genere quidem c. fluxu hæmorrhoid. convenit, modo excretionis tamen ab eodem differt, dum non post facces alvinas aut c. iisdem exprimitur, neque ex infimis intestini recti valis, sed procul dubio ex superioribus intestinis exit, atque uno imò petu effunditur.

- 3.) Fluxus hæmorrhoidalis ordinariè evenit demum ætati virili & senili.
- 4.) Frequentior quoque est sexui virili quàm feminino, nisi forte gestatio totius, partus laboriosior, & ium cessatio. dispositionem quandam propiorem inducant.
- 5.) Fluxus hæmorrh. nimius raro contingit, nisi iis, qui diætâ valde anomala, impr. quoad Animi pathemata utuntur, aut ubi insignis labefactionis viscerum, & scirrhoræ sorte eorundem indurationis iusta subest suspicio.

## III. Prognosis.

- 1.) Fluxus hæmorrh. raro tanta copia, aut violentia erumpit, ut præsens ob jacturam sanguinis effusû vitæ periculum metuendum sit.
- 2.) Longè major enim, imò vix credibilis sanguinis copia spontaneis huiusmodi ejectionibus, absque adeo notabili noxa, aut certe sine lethali eventu, excernitur, quàm artificialibus emissionibus educenda foret. Conf. Stahl. Pathol. p. 754. seq. ubi 4. Exempla memoratu dignissima adducuntur.
- 3.) Hic ipse fluxus tamen, si nimis diu continuat, nimis frequenter recurrit, virium prostrationem, quin Cachexiam tandem inducit.





- 4.) Majus tamen periculum à repentina hæmorrhoidum, præf. verò affuetarum, aut post pertinacia molimina tandem erumpentium, cohibitione, quàm à fluxu earundem, licet immorato & satis copioso, impendet.

#### IV. Remedia.

- 1.) Mitigatio fluxus talis immodici potest tentari pulveribus Dosis & Cinnab., quibus, si non sufficere videantur, succenturiari debet MR. sæpius jam laudata ex C. C. & Tinct.  $\square$ . ad gutt. xxx. vel xl. ter, vel quater de die exhibenda.
- 2.) Habent etiam usum non contemnendum lenia laxantia, impr. rhabarbarina, quæ biliosam acrimoniam abstergunt, adeoque tenesimodem conatum mitigant, dumque egestionem alvinam faciunt, nihil illi expressorium fortius præoccupant.

v. g.

Rx. Fol. Senn.  $\mathfrak{z}$ ij. Rhabarb.  $\mathfrak{z}$ j.  $\ominus$  Absynth.  $\mathfrak{z}$ j.  $\nabla$ æ alicujus  $\mathfrak{Q}$ .  $\mathfrak{z}$ viii, stent in infusione per noctem. Dos. 2. l. 3. cochlear. horis matutinis quotidie capienda.

- 3.) Specifica: in sistendo fluxu hæmorrh. efficacia polent Millef. Dens Hippopot. Lap. Manati, Priapus Ceti, imò præfentius eundem cohibent, quàm sæpe expedit.
- 4.) Adstringentia, urut satispotenter alioquin operantia, v. g. Crocus  $\mathfrak{R}$ . adstringens, ad  $\mathfrak{z}$ j. datus, raro hic aliquod efficiunt, aut si vel maxime cohibitionem præstent, gravissima hypochondriaco-spastica, asthmarodea, cardialgica, colica, imò ascitica, aut hæcematata, pressio pedes sequuntur.

V. Me-



#### V. Methodus medendi c. cautelis Practicis.

- 1.) Hæmorrhagiarum fluxus, si quis alius circumspiciendum tractandus, neq; temere sistendus, aut supprimendus est; certe minime omnium fluxum hunc supprimere licet, præsertim
  - 1.) Ubi fluxus hic post longa & vehementia molimina, sive pathemata hypochondriaca, colica, nephritica, ischiatica, sese exeruit.
  - 2.) Ubi jam diutius assuetatus est.
  - 3.) Ubi statim fere periodicus rediit.
  - 4.) In habitu corporis spongiosiori, &
  - 5.) Ætate jam consistente, vel seniore.
- 2.) Fœminæ quidem exhibitionem illam facilius ferunt.
  - 1.) Si ea sint ætate, quæ ipsis adhuc succidunt.
  - 2.) Si cohibitio illa per externa potius, aut interna illa remedi. prorsus extra Mensium tempus exhibita, peracta fuerit.
  - 3.) Si excretio hæmorrh. ipsis non à directo molimine, sed ab extrinseco, quod ut fere fieri solet, gravamine, nempe ab uteri imprægnati incubitu, aut alvi valde sicce laborioso conatu expressio orta sit.
- 3.) Annotoribus tamen, quibus jam Ræ cessarunt, aut quæ in illis confinis constitutæ sunt, non secure cohibentur Hæmorrhoides.
- 4.) Neque etiam traditionibus illis multum fidendum, quasi moderari saltem, non verò penitus supprimere fluxum hæmorrhoidalem liceat. Longe enim facilius plenaria & pertinax. quidem suppressio, quàm moderamen ejusdem obinetur.

O 2

2.) Quod

- 1.) Quod si tamen præter intentionem contingeret, eundem vel sponte vel arte suppressi, tum ventilationibus sanguinis vicariis per V. Ses in pede, circa Æquinoctia instituendas, aut, si pathemata graviora increbescant, per hirudinum applicationem succurrendum.

- 2.) Hæmorrhoidum suppressionem per intausta talia artificia inductam, si cedemata excipiant, cum abdominis intentia inflatione, fonticum ceriè est malum, cui neque qualitercunque revocatus fluxus, quod ipsum tamen satis difficulter, & vix cum sufficiente successu obtinetur, effatu dignum solamen affert, nisi in vehementioribus subiectis, & habitus minus diffuse spongiosi.



TAB. XIX.

## FLUXUS HÆMORRHOIDALIS SUPPRESSUS.

Notanda hujus sunt

### I. Differentia.

Defectus fluxus hæmorrh. dupliciter considerandus est, 1.) quatenus a) emanet, h. e. non succedit, ubi secundum aliasque circumstantias probabiliter expectari debeat;

2.) vel jam assuetus iterum cessat, h. e. sponte subsistens, aut arte cohibitus, solitis periodis non redit.

### 2.) Quatenus fluxus suppressus

a.) vel adhuc eruptionem molitur, atq; hinc circa locum excretorium varia hujus molani- nis indicia præbet;

b.) vel nulla novæ eruptionis signa edit, verum pristina potius fluxum antegressa, per fluxum verò subsequenter sublata, pathemata, aut alia nova incommoda in partibus remotioribus inducit.

### II. Signa.

- 1.) Fluxum hæmorrh. probabiliter expectare licet, quando in ætate virili, post prægressa varia pathemata splenetico-hypochondriaca, variis spastici circa regionem Ossis sacri & lumbos dolores, impr. cum tenesmode conatu egerendi sese exerant, intercurrente sensu rei alicujus duræ, v. g. nuclei intus in intestino recto hærentis, imò cum actualibus ani protuberantis doloribus, quas hæmorrhoides coæcæ vocant, aut cum excretionibus mucicis, insit. Gum. Tragæ. solut.

- 1.) Motus hæmorrhoidalis, eruptionem denuo molientis, proxima signa sunt dolores tensivi, per longitudinem Osis sacri, & juxta ejus latera in coxis, it. morfus intus in intestino recto prope exitum, sæpe admodum sensibiles: nec non alia symptomata consue-  
ta, v.g. tussis, fluxum ani antecedere vel comitari solita, circa statas periodos, vel majores anni mutationes, h.e. verno, vel autumnali tempore, revertentia.

### III. Prognosis.

- 1.) Fluxus hæmorrhoidalis ritè succedens, uti à gravibus variis malis, v.g. Melancholia, Nephritide, Mictu cruento, Podagra &c. præservat, imo liberat, recte Hippocrate L. VI. Aph. II. ita ejusdem suppressio pristina hæc mala ut plurimum reducit.
- 2.) Sponte tamen subsistens non ita præsentissima & gravissima noxas infert, majorem etiam renovationis spem relinquit, quam alius oppressus.
- 3.) Intausta enim per artem imperitam cohibito non solummodo dicta incommoda certo certius revocat; sed & nova, imo pejora, v.g. Asthma convulsivum, Catarrhus suffocativum, Vertiginem, quin Apoplexiam, Hæmicam, Hydropem, monente jam Hipp. L. VI. Aph. 12. inducit.
- 4.) Tolerabilius omnino est, fluxum hæmorrhoidalem secundum præsentem circumstantias non injuria expectandum, emanere, quam eundem, post factam eruptionem, vel crebriorem, præsertim statis periodis, recursum, subsistere, vel incongruis medicamentis suppressi: quorum utrumque etiam in ætate senili nunquam periculo vacat.

### IV. Remedia.

- 1.) Massam humorum attenuant, atque obstructions in genere referant diluentia, aperitiva amara, hepatica & sple-

& splenetica dicta, & pleraque, quæ alias in obstructione Ejum commendari solent.

- 2.) Motum sanguinis ad inferiora blande invitant, laxantia, præsertim cum modo dictis aperientibus sociata, v.g. Pil. Bech. Tartar. Bontii, de Ammoniaco Querc.
- 3.) Eruptionem fortius incitant stimulantia rum interna, v.g. Aloetica, Colocynthiaca, Helleborina, tum externa v.g. Suppositoria acria, trichiones cum foliis ficulneis, vel panno asperiore, hirudines, equitatio.
- V. Methodus medendi, cum Cautelis Practicis.
- 1.) Vicariæ sanguinis ventilationes vix unquam quidem fluxum hæmorrhoidalem suppressum sufficienter compensant; conducit tamen plurimum generalem talem ventilationem evacuationem medicamentis præmississe.
- 2.) Postmodum omni studio sanguinis dilutioni, attenuationi, atque obstructionum refectioni opera detur.
- 3.) Tandem, si aliqua, aut solita circa locum excretionis molimina compareant; modeste stimulantia subjungantur, v.g. dosis auctor Pil. Bech. quin & hirudinum applicatio tentetur.
- 4.) Nihil vero hic imperi tentandum, multo minus moliminibus istis spontaneis cessantibus, vel, ubi gravius alicujus & profundioris viscerum læsionis suspicio subest;
- 5.) Potius incommoda in partibus remotis sese exarentia, vel motum hæmorrhoidalem eminens saltem respicientia, temperantibus Ossis, blandioribus laxantibus, Vse præservatoriis in pede, circa Equinoctia repetenda, imo, si importunius urgeant, hirudinum applicatione præcaveantur & leni cur.
- 16.) Opiata vero & marina illa antispasmodica alias credita, v.g. Lsp. Manat, Dens H ppopot. Unicorn. Ver. Priapus Ceti &c. exulent. Certè enim hæc ultimq. loco allegata virtute possunt fluxum hæmorrhoidalem specificè veluti cohibendi: utinam æque certa innotescerent Specifica eundem revocandi.

## HÆMORRHOIDES COECAE.

Harum notanda sunt

I. *Differentia*: Hæmorrhoides cœcæ solent distingui in turgentes & tumentes:

- a.) Turgentes non solum vasculorum sanguiferorum infarctum, sed præsertim etiam ipsius cuticulæ extensionem inferunt, ita, ut veliculæ ejusmodi pellucidæ, à sanguine transparente lividæ, tactu molles, non adeo exquisitè dolorificæ sed solo ferme ardore molestæ, taciem exhibeant.
- b.) Tumentes, quæ etiam *var. hæm. cœcæ* & dolentes audiunt, verum sistunt tumorem inflammatorium, à stasi sanguinis in vase aliquo hæmorrhoidali conceptum, vehementem non solum ardentem, sed etiam vellicantem, pulsantem dolorem interentem, & nihil aliud sunt, quam verus furunculus in sensibili illa, non modo nervæ, sed & musculosa tunica intestini recti, circa sphincterem ant collectos, inflammatoria stasi exquisitissimum dolorem inferens.
- c.) Trahunt nonnulli huc alias quoque protuberantias, quin excrecentias ulcera scentes circa anum; sed hæc plerumque contagio, & quidem Venereo, naturales suos debent.

II. *Subiectum.*

- 1.) Hæmorrhoides cœcæ variis in alia corporis dispositione, ne. nisi temperamento phlegmatico, aut de phlegmatico participante occurrunt.

a.)

- 2.) Eveniunt etiam non raro feminis ex partu laboriosiori, vel ultimo gestationis tempore, præcipue si multum desideant, ex compressione intestini recti à fetu grandiore incumbente.
- 3.) Frequentius quoque obtingunt personis hæmorrhoidalem fluxum penurientibus, quam jam diu eidem assuetis.

III. *Prognosis.*

- 1.) Hæmorrhoides turgentes scalpendo, vel alia ratione apertæ, fundunt sanguinem non solum, quem continebant, sed etiam plus ejusdem succi sive supeditant; ita, ut non raro ipsius fluxus hæmorrhoidalis initium præbeant.
- 2.) Post apertionem vero collabuntur & corrugantur, atque veluti papulas quasdam formant, quæ dein sub fortioribus pressionibus alvi egerendæ, sanguinem denuo fundunt, idque sine certo typo, sive ordine, imo ferme assiduò.
- 3.) Aut si hoc facere desistant, degenerant non raro in ulcuscula pruriginosa admodum molesta.
- 4.) Hæmorrhoidum cœcarum tumores & dolores immanes quidem, vix tamen vitæ periculum inferunt.
- 5.) Quod si tamen ultra 3. vel quatuor diem dolor & inflammatio persistit, vix amplius discussionis spes superest, sed succedit suppuratio; Quæ facta, si apertio & mundificatio negligatur aut protrahatur, facile fistula aut hinc enascitur.

IV. *Remedia.*

- 1.) Discussioni Hæmorrhoidum cœcarum dolentium, specifice virtute interservire dicuntur Infusum Millefolii,

P

Sutk.



Suffragium ex muribus marin., radix Telephii, aut Scrophulariæ, amuleti instar gestata.

2.) Dolores mitigant

- ) internè Osa, emulsiva, & in calu necessitatis, amodyna; it. blandiora laxantia, mannata & sennata, præsertim cum ☉ fulminante.
- ) externè emollientia, & simul leniter resolutentia, v. g. fi. Verbasci, Linariæ, (quibus vis specifica foret tribui) it. mucilag. Sem. Cydon. Psyll. rad. Sigill. Salom. &c.

Exempli loco:

R. Sem. Psyll. ʒi.  
Rad. Sigill. S. ʒʒ. F. c. ▽. rof. mucilago.  
cui adde Album. ovi no. 1. Camph. ʒʒ.  
Tincturæ Opii ʒʒ. M.

Vel R. Sem. Psyll. Cydon. aa. ʒij.  
Rad. Sig. Salom. ʒij.  
F. c. ▽. rof. mucilago. adde vitell. ovi  
recons no. 1. Camph. gr. v. Opii gr. ij. M.

- 3.) Præsertim favent tempestivæ Vses in pedibus, aut applicatio hirudinum tempore intercalari, non vero in ipso paroxysmo doloris instituenda. (non enim sugunt hirudines tum appositæ.)

V. Methodus medendi cum Cautelis Practicis.

- 1.) Ante omnia quidem tentanda est discussio, tum per VSnem in statu plethorico, tum per supra dicta specifica tam interna, quam externa.

•) Suffragium ex muribus marin., radix Telephii, aut Scrophulariæ, amuleti instar gestata. •) Hac

- 2.) Hac vero minus ex voto succedente, maturatio, & tandem apertio est promovenda, per cataplasmata emollientia ex Cepis assatis, Fol. Malvæ, & Lin. Medulla crur. vitulin. &c. Imo tandem apertio chirurgica ope lanceolæ est tentanda. Hac enim peracta, omnis dolor in momento cessat. Conf. Hîstor. Morb. Vratislav. pag. 195.

- 3.) Denique mundificatio & consolidatio omni studio est promovenda, tam per externa balsamica, v. g. R. Ess. Succin. Myrrh. a. ʒi. ʒi laterin. ʒi. M.; quam interna (præsertim si diutius protrahatur cura) Laxantia scilicet & depurationi lymphæ ac sanguinis alias dicata, v. gr. R. Succin. cum Tinct. ʒi ʒi.



## FLUXU MENSIIUM NIMIO.

*Fluxum Menstruum nimium notanda sunt:*

I. *Signa.*

- 1.) Fluxus ☿ ille reputari debet nimius, qui vel nimis confertim & copiosè, contingit, atq; etiam cum frustorum conglutorum excussione conjunctus est, vel nimis citò, & ut plurimum inordinate, revertitur, vel justò diutius durat.
- 2.) Præcipuum autem criterium, quo fluxus ☿ nimius à fluxu saltim largiori & abundantiori distingui potest, est tolerantia, vel *insensibilitas* patientum, nimirum ubi ante fluxum talem largiorem gravativus quidem languor adest, quem communiter pro debilitate interpretantur, qui tamen non solum non augebit, fluxu largiori insequente, sed potius *mitescit*; ibi nondum excessus mensium agnoscitur potest.
- 3.) Ubiqueque vero hujusmodi valde largum fluxum non solum comitatur, sed etiam insuper sequitur, & superstes manet vera aliqua debilitas, imprim. cum malo colore patientis magis magisque increbescente, ibi utique fluxus nimius incusandus est.

II. *Subiectum.*

- 1.) Mensium fluxus nimius, impr. confertim, & cum impetu factus, rarò obtingit junioribus, sed annosioribus potius, siue circa confinia plenariæ cessationis ☿ium constitutis, vel post abortum, vel molæ exclusionem, vitium aliquot uteri superstes foventibus.
- 2.) Junioribus quidem plethoricis, iracundiæ, aut speculationibus præi: indulgentibus, fluxus ☿ largior, imò immo.

immoderatio & frequentior evenire potest; sed si cum impetu & violentia insigni erupisse dicitur, talis hæmorrhagia ut plurimum abortiva est.

III. *Prægnosa.*

- 1.) Mensium excessus, præterquam planè summus, quod tamen in menstruo fluxu propriè sic dicto revera insensibilem quiddam est, longe pauciores posteriores. n. o. xes post se trahit, quàm qualiscunque defectus.
- 2.) Abit tamen faciliè in assuetudinem, & trahit post se varia incommoda, partim circa concipiendum & gestandum totum, partim circa partum, & post eundem.

IV. *Remedia.*

- 1.) Orgasmi sanguinis generalem temperant tres absorbentes, Qst., Cinnabari. Motum sanguinis, ad uterum ruentis, divertunt Ligaturæ, & juxta Hippocr. consilium, cucurbitulæ majoris applicatio sub mammis. Vid. ejusdem Aphor. 50. L. V.
- 2.) Fluxum specifica quadam energia moderantur Pilulæ Becherianæ, genuinæ, & securius, ac lenius, Pilulæ Stahlianæ.
- 3.) Fluxum positive cohibent cum anodynâ sociata adstringentia, v. g. ☿ Heurnii, quem in Comment. ad Hippocratis Aphor. superius citato proponit:

Rx. Sem. Hyost. alb.

Papav. alb. ʒss.

Lap. Hæmat.

Corall. rubr. ʒss.

Camph. ʒss.

Dosis ʒss. mane & vesperi capienda. It. Vitellus ovi ex Gallina mactata extracti c. N. M. à Lenti. commendatus in Miscell. Pract. p. 480. Denique

2. Millefol. ejusque Essentia.

P 3

4.) To-

4.) Tonum partium roborant. *Mialia*, vulgò *aperitiva* dicta. It. *Sia* *Vlia* aut ~ *urinosa* c. *Tind.* *Qri*.

V. *Methodus medendi* c. *Cautelis Prædictis*.

- 1.) Fluxus quous pariter ac *Hæmorrhoidalis* nimius, promptius plenariam suppressionem, quam aliqualem saltem moderationem admittit.
- 2.) Plenaria tamen fluxus mensuri cohibitio, præter intentionem facta, facilius convenientibus medicamentis corrigi potest; quam *hæmorrhoidum* suppressio.
- 3.) In fluxu nimio ad justum moderamen redigendo *Pilul. Becheri*, aut *Stahlii* plus præstant, quam ullum medicamentum.
- 4.) In malo verò tam confertim, quam iustò diutius & sæpius infestante, infusa cum epicrasi laxantia, etiam cum vino parata, satis commodam operam præstant.
- 5.) Si fluxus simultaneus, copiosus, & vehemens contingat, & magna quantitas jam profusa sit, habent locum adstringentia etiam paulo fortiora, v. g. *Crocus* ʒ. *alis*, ad gr. iv - v. c. gr. j. *MP. de Cynogl*.
- 6.) Interpositis his, quæ orgasmum sanguinis contemperant, nempe *Qlis* & *Cinnabarinis*.
- 7.) Neque etiam pro diversione affluxus in tali casu contemnendæ sunt *Ligaturæ*.
- 8.) Abusus Opiatorum hic utique etiam vitandus, aliis, præsertim cum adstringentibus largius data, modo *Hæstican*, aut febrem lentam admodum, modo *Oedemata*, quia hydro-picos tumores invitant.
- 9.) In quacunque nimio fluxu, præservativè plurimum prodest V., intermedio tempore, & juniore adhuc ætate in brachiis, aut sine ullo scrupulo, in pedibus instituta.

TAB. XXII

TAB. XXII

DE

## SUPPRESSIONE MENSIIUM.

Hujus notanda sunt

I. *Differentia*.

Defectus fluxus Menstrui triplicem meretur considerationem.

- 1.) Iusto tardius erumpit, atque ultra tempus solitum, annum sc. 14<sup>um</sup>, imò ad 20<sup>um</sup> usque aut per totum vitæ tempus emanet,
- 2.) maturius quam par erat, hoc est, ante annum 49. cessat,
- 3.) solito majora intervalla format, h. e. ultra tres septimanas subsistit, aut iusto paucius, vel brevius fluit.

II. *Subiectum*.

- 1.) Mensium defectus, imminutio, & pedetentim invalescens suppressio familiaris evenit præsertim plethoricis, spisso tamen sanguine affectis, & mucido lentore feri laborantibus, vitæ sedentariæ deditis, potui pariori assuetis, frigori frequentius expositis, morori, terrori, anxio desiderio, obnoxiiis.
- 2.) Repentinam autem oppressionem facile incurrunt, quæ proxime instante, aut jamjam emicante fluxu, largas è partibus superioribus sanguinis emissiones frivole suscipiunt, aut ventriculum emeticis drasticis, aut assumptis dyspeptis, v. g. placentis pinguioribus & calidis, pane recens ex furno extracto, turbant & onerant, sub illo ipso temporis articulo pedes ac partes inferiores v. e. frigida impmittunt, ibique diutius commorantur.

2.) Fos.

- 2.) *Fœminæ*, quibus fluxus mensium cum phasibus *Æ* conspirat, ita, ut circa Novilunium, vel Plenilunium contingat, illæ plerumque & ordinatiorem & constantiorem fluxum experiuntur; Quibus vero promiscue sine observatione phasium *Æ*, menses fluunt, nunquam satis has certas periodos observant, sed communiter, vel anticipant, vel postponunt, donec magis magisque titubando, sensim plane deficient.

### III. *Pregnesis.*

- 1.) Mensium defectus longe familiarior est, præsentiora quoque & graviora damna infert, quam eorum excessus. Morbi enim muliebres tantum non omnes defectum mensium aut causam, aut comitem habent.
- 2.) Mensium defectui, multo magis eorundem suppressioni familiarissime succedunt angustię sub motibus corporis, præsertim ascensoriis, asirudo artuum, dyspnœa, palpirationes cordis, pathemata hypochondriaca, suffocationes imo Epilepsię hysteriçę, spasmi artuum, convulsivi affectus, Paralytes spurę, dolores arthritici, Vertigines, Cephalalgie contumaces, Hemicranie, Erysipelata, Ulcera crurum cacoethica, denique Hæmorrhagię effrenes narium, Hæmoptysis, Vomitus cruentus periodicus, Cachexia, Oedemata, quin Hydrops.
- 3.) Quibus fluxus mensium admodum præcox emicat, iis quoque maturius cessat, & vice versa: quibus tardius erumpit, iis magis cito desinit.
- 4.) Quę fluxum menstruum plane non experiuntur, illę ut plurimum aut sunt steriles, aut valetudinarię.

### IV. *Remedia.*

- 1.) Plethora ventilandę inservit, adeo quæ nimias vasorum disten-

distensionem, & porro oppletioni succurrit *V*isio, tempore intermedio, in brachio, instante autem fluxu, in pede instituta.

- 2.) Sanguinem spissorem attenuant, & Seri mucositatem re solvunt:

1.) quę aperitiva vulgo audiunt, v.g. Rad. Ari, Rubiæ Tinctorum, Cuccum. Cichor. Teraxac. Gramin. Herb. Fumar. Absinth. Centaur. min. Chamædr. Cuscuta. Capill. Fris. Marrub. Abrotan. Gum. Ammon. Galban. Sagapen. & ia digestiva.

2.) pleraque Alexipharm. & anticatarrhatia, v.g. Rad. Angel. Pimp. Helen. Imperatorię, Vincetox. Petasit. Levist. Marum verum, Rosmarinus, Serpillum, Costus verus, Cinamom. Maceres, Sem. Anis. Fœnicul. Myrrhata, Crocata, Succinata.

- 3.) Specifica virtute emmenagoga pollere creduntur Flor. Calendul. Cheiri, HB. Melissę, Puleg. Sabinę, Rad. Bryon. Borrax Veneta, & ex arillis Cynosbati expressum, Pil. Becher. Fuligorum cruda, tum ~ & o ejusdem.

- 4.) Motum ad locum excretionis debitę invitant *V*is. in talo, Pediluvia, Infusio, Laxationes per osiduum continuandę, sive per Pil. Bech. sive per Infus. ali-quod, ex supra dictis aperitivis, cum Senn. & Rhab. ac Helleb. nigr. paratum; tandem applicatio *Θ*is *Α*lis urinosi, ope instrumenti Glauberiani immediate ad uterum: instruendo præprimis horum subsidiorum apparatus, versus tempora conlucta & debita hujus excretionis, aut versus extantiores phasę *Æ*, sc. Novi. vel Plenilunium.

- 5.) Blandam Venę Portę, & vasorum vicinorum striduram inducunt, hincque expressionem sanguinis per atrium promovere *Α*lia. temperantiora tamen, neq; acidis



acidis fortioribus nimis alterata, v. g. Limat.  $\mathcal{P}$ . tenuior, Crocus  $\mathcal{P}$ . c. Are, Crocus  $\mathcal{P}$ . c. Olibus Stahlü. Ess.  $\mathcal{P}$ . c. Succo pomorum, Ess.  $\mathcal{P}$ . helleborat. Wedel. Tinct. Oli  $\mathcal{P}$ . Ludovici, ut & Zvvölfleri; Imo huc etiam faciunt Fl. recent. Acacia, nec non Ess. Millefol.

- 6.) Symptomata graviora, v. g. anxietates, dolores & phlogosés intercurrentes, mitigant Osa c. Cinnabar. sociata, certe hoc nomine longe præferenda.

V. Methodus medendi c. Caut. Practicis.

- 1.) Tria potissimum in cura attendenda: 1.) plethora, quo magis urget, eo magis ejusdem imminutio reliquæ medicationi præmittenda, 2.) debita sanguini fluxilitas concilietur, & viæ expeditantur, 3.) tum demum motus ad locum excretorium invitetur, leniter stimuletur, revocetur.
- 2.) In junioribus, intra annum 18. constitutis, sæpe, atque VSne, solis aperientibus & leniter stimulantibus adjuncta, Natura excretionem peragit.
- 3.) Ubi vero præsentiora incommoda vere urgent, tum, pro commodiore sanguinis spissifusculi attenuatione, necessario præmittenda videtur, ibi etiam non adeo anxie de VSne dubitandum est.
- 4.) Ante omnia prudens subordinatio medicationum hic est necessaria, ita, ut alterantia, & quomodocunque aperientia subjungantur debitis ventilationibus, conjungantur vero modestis commotionibus sanguinis per agiliorem vitæ rationem; stimulantia autem, non, nisi his præmissis, & sanguine jam ad exitum disposito, veluti colophonis, loco addantur.
- 5.) Pellentia sive stimulantia improvide adhibita, h. e. in statu insigniter plethorico, non præmissa primarum via.

viarum repurgatione, & alvi aperitione, sanguinis dilutione & attenuatione, familiariter majores obliationes cum summis angustis & anxietatibus, aut heteroclitas per loca aliena sanguinis eruptiones, imo hædicas, aut sane lentas extenuantes febriles, phthificas, cephalalgicas, spasticas, imo convulsivas consecutiones, inducunt; in spongiosioribus vero Cachexiam, imo tandem Oedemata post se trahunt.

- 6.) Idem quoque tenendum est de ribus Albus, quæ pariter quantitati sanguinis abundant, & qualitati non satis dilutæ plane non quadrant.
- 7.) Vulgata illa opinio in ipsis paroxysmis febrilibus, ut & fluxu menstruo durante, usum remediorum minus fore tutum, error est; siquidem illo ipso tempore exhibita remedia, (sed NB. convenientia,) longe felicius atque efficacius operantur, quam extra hanc opportunitatem temporis data.
- 8.) Hinc, si menses fluant, non rite tamen, nec sufficiente copia, aut consentientia debita, tum omnino placidum eorum successum per lenia stimulantia promovere licebit.
- 9.) Cessante vero fluxu, diluentibus potius & aperientibus per totum illud tempus intermediam insistentium, ac non, nisi versus periodum excretionis instantis, ad emmenagoga recurrendum.
- 10.) Eminent inter hæc Myrrhata & Crocata, quibus, si conamina ad excretionem laboriosa concurrunt, Ess. Millefol. jungi potest, v. g.

Rx. Ess. Millefol. p. iij.

Succin. p. ij.

Myrrhæ. p. j. M.

Q. s.

Vcl:

Vol:

℞. Ess. Millefol. ʒi.

Succin. ʒʒ.

Croc. Orient. ʒj - ʒʒ. M.

Dof. XXX. XL. gr. bis de die.

℞.) Faciunt quoque ad scopum hunc sequentes Pilulæ:

℞. Extr. Card. Ben.

Fumar.

G. ʒ. in ʒto squillit. solut. aa. ʒj.

Myrrh. electæ,

Aloës Soccotrin. aa. ʒj.

G. Heder. ʒʒ - ʒij.

Croc. ʒʒat. gr. XV. M.F. MP.

Dof. gr. XV.



TAB. XIIII

TAB. XIIII

**HÆMORRHAGIA UTERINA,**  
tam abortiva, quam partum legitimum  
concomitans, aut insequens,

frue

**LOCHIORUM FLUXUS NIMIUS.**

Notanda hic sunt

I. Signa.

- 1.) Hæmorrhagia abortiva est, quando scemina maritata post 3. vel 4. tam parum, hactenus subsistentium, periorum, successivam ventris turgescientiam, & alia imprægnationis signa, sanguis ex utero manare incipit, satis quidem leniter & modeste ab initio, instar legitimi fluxus menstrui, (qualem & gravidis citra abortum contingere posse, Observationes docent,) tandem tamen enormi copia ac violentia erumpit, cum insignibus anxietatibus & lipothymicis, imò syncopeticis, deliquis, præcipue post abortum, semel jam, vel iterata vice, & ferè circa idem gestationis tempus, factum.
- 2.) Aut quando post vehementiorem Animi corporisq; motum, v.g. casum ab alto, iram, terrorem, potum astutiosum, pellentium improvidum usum, statim cum impetu enormi sanguinis profusio gravidæ evenit.
- 3.) Partum legitimum non æque frequenter, ut abortum, comitatur, rarius antecedit; non ita rarò verò insequitur insignis sanguinis profusio, aut fluxus lochiorum nimius, cum anxietatibus, ut pluit, torminosis, & valde dolorificis spasticis in abdomine, & circa uterum impri-

Q 1

impri-

imprimis, sensationibus, idque fere sub tardiore secundinarum successu, aut portionis earundem avulsa restitutione in utero.

### II. *Salicetum.*

Hæmorrhagia talis uterina, tam abortiva, quam partum legitimum comitans, aut insequens, facilius evenit, plethoricis, cholericis, diætæ vinosæ addictis, fluxum æruum largiorem, quin fere nimium, experiri solitis, V. Sem medio gestationis tempore negligentibus, abortum etiam semel, iterumque, suppressis, atque à puerperio proximè prægresso minus rectè expurgatis.

### III. *Prognosis.*

- 1.) In abortu, quò immaturior est conceptus, eò gravior hæmorrh. comitatur ejus elisionem.
- 2.) Hæc ubi admod. jam invaluit, ante abortus exclusionem peractam, nulla speranda est remissio, nedum cessatio.
- 3.) Idem etiam de Fluxu Lochiorum nimio sentiendum, ubi Secundinæ vel in totum, vel ex parte resistant, scil. nullam, nisi secundinis perfectè excretis, fluxus hujus obtineri possit mitigationem.
- 4.) Fluxus Lochiorum nimius, imprim. c. impetuum, pens, fonticum certe periculum minatur, & sæpe intra quadrantem horæ puerperam gravissimè exhaurit, imò jugulat.
- 5.) Lentior etiam, diuturnus tamen, & pariter justò copiosior, fluxus vel gravem æ. perturbationem, vel sterilitatis, aut certe infelicitis gestationis, periculum inducit.
- 6.) Mediocris tamen excessus minoris periculi est, quàm notabilis deletus, nedum plenaria suppressio, etiam post fluxum largiorem facta.

IV. R.

### IV. *Remedia.*

- 1.) Metum ejusmodi hæmorrh. præoccupant a.) V. S medio gestationis tempore administrata, imò, si reliquæ circumstantiæ exigere videantur, etiam circa partus instantis tempus repetita, ß.) decens post legitimam totus & secundinarum exclusionem, ligatura abdominis, & γ.) quies & tranquilla continentia puerperæ, impr. abstinentia aut temere affectata orthostadia, aut multis fermocinationibus.
- 2.) Commotionem sanguinis orgasmicam sedant pulveres absorbentes Mosi & Cinnabari.
- 3.) Ipsum sanguinis profluvium cohibent adstringentia, inter quæ tamen mitiora eligantur, v. g. Corallata, &ia, v. g. Crocus &iahs, ad gr. v. vi. vii. c. absorbente aliquo, & gr. i. vel is. MP. de Cynogl. it. Tin&. Gli &ia. Ludovici, porro species de Hyac. Trochisci de Carabe, tandem Millefol. sive in forma Ess. sive In. fusi, sive Extra&ia. adhibendum.
- 4.) Fluxum ad justam mediocritatem reducunt, sine plenaria suppressione, Pil. Stahlî, in robustioribus etiam Becherianæ, sed genuinæ.

### V. *Methodus medendi c. cautelis Practicis.*

- 1.) In ejusmodi casibus, ubi vehemens talis sanguinis ex utero in prægnatus profusio in horas invalescit, & præsentissimum lethalis eventus metum incurrit, imprimis, ubi Lipothymia jam prævaluerunt, adeoque nulla factus conservandi spes superest, ibi neque otiosum spectatorem esse, neque adstringent. & roborantibus abortum retardare decet, sed potius ejusmodi exclusio maturanda & promovenda est, quod fieri potest per hepar Anguillæ ad ðj. in MRa analptica datum.

a.) Pæ

- a.) Pariter quoque, si partum legitimum impetuosa sanguinis Lochialis effusio subsequatur, quamdiu Secundinæ, aut lacinix illarum resistunt, irrita sunt omnia conamina aliter subveniendi; medicatio verò per adstrictionem etiam actu noxia.
- 3.) Abortu tandem excluso, aut secundinis perfectè excretis, tum demum hæmorrh. comes moderamen admittit, quod nihil certius præstabit, quam modo laudata MP. Stahlii, quæ Secundinarum quoque excretionem adjuvat.
- 4.) Non in consilium tamen est, impr. post abortum, etiam moderamine debito obtento, usum huiusmodi per dies aliquot continuare, ut uterus rite expurgetur, id quod post abortum Natura sibi relicta, raro sufficienter peragit, & hinc novi abortus causa esse potest.
- 5.) Profusionibus repentinis, si nullum aliud remedium efficax ad manus sit, opponenda utique sunt Adstringentia: Inflammationis tamen & febris superventuræ periculum, per summo studio, temperantia, discutientia, & diapnoica blanda præoccupandum est.

TAB. XXIV.

TAB. XXIV.

## FLUXUS LOCHIALIS IMMINUTUS

aut plane suppressus,

Circa *Fluxum Lochialem imminutum*, aut plane suppressum notanda sunt

### I. Signa.

- 1.) Fluxus Lochiorum legitimus vix intra 14. dies penitus cessat, non, quod toto hoc tempore sanguis fluat, quod rarius septimum diem transsit, sed post sincerum sanguinis fluxum, ichor, magis magisque pallescens, tandem quantitate quoque indies decrescens, plane desinit.
- 2.) Quantitas c. habitu & statura puerperæ, cum excretionibus expressis, tam in genere menstruis, quam in specie Lochialibus, huic individuo familiaribus, proportionem servare debet, à qua norma si deflectat Lochiorum successus, status est p. n. & morbosus.

### II. Subjectum.

Imminutionem, quin omnimodam suppressionem Lochiorum facile incurrunt femine plethoricæ, moriori, timori, terrori valde obnoxie, refrigerium incautè adnitentes.

### III. Prognosis.

Rarissima sunt exempla, ubi puerperæ, Lochiorum malo successu, nedum plena emansione, tolerabiliter se habent, communissimè se non semper in præsentiam, tamen in posterum certissimum ipsis creat periculum. Sequuntur non statim non modo copiosa excretionum sanguinearum suppressarum incommoda, angustia

R

stia



stia & anxietates circa præcordia, & varii spastici affectus in abdomine, sed propemodum longe certius, quam in ulla alia hæmorrhagia, nificum vulnere sensioil oris parit conjuncta. Febris inflammatorie, Purpura miliaris, & status puerperæ admod. fonticus; Impositum vero incupitatem & feliciorera conceptionem, ac gestationein non parum turbat, & stabiles inflammationes ab dominis, ac varios spasticos hypochondriaco. hystericos affectus post se trahit, insufficiens Lochiorum successus.

IV. Remedia.

- 1.) Debitum Lochiorum successum promovent & conservant Crocata, v. g. Crocus in cibis, parcissimè tamen ad levem iusculorum tincturam usurpatus, it. Ess. Croci saturatio, sed idem moderatissimis dosibus, ad pauculas gutt. cum alitis adhibenda, v. g.

R. Ess. Scord. per V. R. paratæ. ʒi.

Pimpin. (quæ c. V. debiliori extrahi poterit) ʒij.

Croci ʒi. M. Dos gutt. xxxv. bis l. 4. per diem.

- 2.) Quodsi verò fluxus nimis parvus stimulo indigere videatur, addi poterit Ess. Myrrh. ʒi. & simili methodo M. Ra. laudata propinari.

- 3.) Illis quæ etiam alias non insueræ sunt, neque febrilis alicujus exæstuationis indicia præsto sunt, (impr. 4to die jam superato,) modicum vini, sed generosissimè in iusculis, tum etiam bibendum datum, non solum periculo vacat, sed sæpe etiam uti non caret.

- 4.) Ad febriles exæstuationes præoccupandas semper sub noctem exhibetur dos moderata pulveris leniter diapnoici, ex. Oz. 69. l. Matr. perl. præparat. p. iij. & ʒi. diaph. p. ii.

- 5.) Imo, ubi jam actualis æstus præternaturalis emicat, quoque addi potest. Nutrim enim ʒi. vi. ad viii. exhibitum

bitum, innoxium hic esse, neque nullo modo diarrhæas (puerperis alioquin valde scemiales,) inducere, sed potius præoccupare, quin minuire, quotidiana experientia, abundè confirmat.

- 6.) Pil. Becher. aut Stahl. hoc in casu dicuntque uti, et integrum, vel libitum fuerit, & eon modo emnibus aliis stimulantibus & pellenibus, ut pote nimis fids minusque totis superse debet.

V. Cautela Præctica.

- 1.) Quando Lochia intempestivè subsistunt, aut planè supprimuntur, nihil magis cavendum, quam, ne illorum revocationi opera impendatur per calidiora Castorea, Myrrhata, Aloëtica, Uterina, copiosius ingesta. Vel enim obstructio augetur, & febris inter gravia abdominis pathemata provocantur; vel Lochia etiam denovo erumpentibus, inflammatio uteri & febris perdurant.

- 2.) Præstat potius orgasmum sanguinis temperare & cohibere absorbentibus, diapnoicis, ac Cinnab., æstuosos verò impetus etiam nitratis, adeoq; incommotis potius ex Lochior. suppressione metuendis præoccupandis, quam fluxui directè revocando operam dare, præsert. si jam ultra vixit, quæ subsisterit.

- 3.) Quod si in actualem febrem exardescat morbus, tunc his ipsis potius absorbentibus, temperantibus & diapnoicis insistatur, parcissimis dosibus temperaturum Alexipharmacorum subordinatis, conjuncto regimine modestissimè diapnoico; nullo autem modo sudatorio, abstinendo ab omnibus irritationibus ad quasi-ber evacuationes. Imprimis verò per alvum, ut & suppositionibus intempestivis per Opiata.

# MALO HYPOCHONDRIACO- HYSTERICO.

Notanda hic veniunt

## I. Signa Mali

a) Hypochondriaci sunt. 1.) frequentes tensiones & pressionis, imo interdum acerbiores dolores sub costis, frequentius tamen in latere sinistro quam dextro, aut certe in hoc magis transitoriè, & cum volarico æstu, imprimis capitis, & rubore faciei stipati, sit 2.) sine formali febre, aut alio constanti typo, ita pe- tamèn & multum per intervalla instantes ac præcipue post errores dieteticos atque pathemata animi re-rudeſcentes, 3.) cum appetitu vago, communiter tamen auctiore, & satis avido, 4.) alvo mox fluidiore, mox pertinaciter adstricta, communiter tamen strictiore, 5.) Urina in paroxysmis graviorebus emissâ fere limpida, extra hoc tempus vero (crist illa- los & inas) eas lateribus vitri affigentes, 6.) Ructibus, borborigmis, flubus, palpiratione cordis, familiaribus, 7.) frequentius suspiriis & angustis præcordialibus, imo ipsius animi angoribus, & non raro delirio anxius, 8.) raro cum exquisito dolore capitis, sed potius vertiginosa & gravativa ejusdem perturbatione, atque cogitandi ac reminiscendi veluti im- potentia.

b) Hysterici sunt pathemata modo recensita tantum non omnia, sed fere acerbiora, & 1.) cum lenibili, & 17

pe istu externo perceptibili, volutatione in abdomine inferiore, hujusque d præcordis & tunc ad- scensione, ac respirationis temporaria interceptione, sive suffocatione, 2.) vomitibus, aut certe vomendi conatibus, 3.) doloribus capitis, aut tere hemi- cranici, aut possimum frigoris exquisiti exiguum circumferentiam obducentis, intercanibus, 4.) evidentioribus & cum ataxis, aliisque uteri vitis, stipata.

## II. Subj. Sum.

Facilius & frequentius huic malo obnoxia sunt 1.) personæ temperamenti Melancholici, aut Sanguineo-Melancholici, 2.) status corporis plethorici, 3.) vitæ desid. speculationibus indulgentes, 4.) potui periculi addicti, satietate edaces, 5.) juvenes inira annum 18 & 25. constituti, 6.) teminæ mensium cessationem expectæ, merori, aut iracundæ multum deditæ &c.

## III. Prognosi.

- 1.) Pathemata Hypochondriaca plerumque plus formidinis quam periculi afferunt.
- 2.) Majoris vero periculi est malum Hypochondriacum in senioribus, quam junioribus: quippe incunte jam virili ætate, præsertim vero mutata in simul-dieta, & vita sedentaria, sponte eodem liberari solent.
- 3.) Fluxum hæmorrhoidalem passionibus hypochondriacis supervenire bonum est; est passionis hypochondriacæ hæmorrhoidibus subsistentibus, vel suppressis, succedere, malum.

## IV. Remedia.

- 1.) Generalem sanguinis immutationem præstat VS. in brachio; speciali magis ejusdem derivationi infer-

vix VS. in pede: apertio hæmorrhoidum per hirsutines: fluxus menstrui in feminis promotio.

- 2.) Sanguinis spissioris dilutionem & attenuationem promouent potus largior, & motus proportionatus, sibi invicem subordinati, atque prudenter conjuncti. Porro remedia: alias antiscorbutica dicta: succus Cochleariæ, Extract. Fumariæ, Abinth. Cent. min. G\*. Galb. it. Oia digestiva: ☐ Olatus, ☐ ☐ latus, Li-  
quor ꝑ. fol. ☐ ri, ☐ ☐. Tinct. ☐.
- 3.) Spasticas partium aff. & arum stricuras demulcent Osa cum Cinnabarinis, porro blanda Laxantia, & imprimis Enemata emollientia Osa.
- 4.) Ructibus præoccupandis, & stasibus discutiendis inserviunt tum modo laudata Oia digestiva, & laxantia, In specie vero Pilul. Poly. hrestæ Becherianæ & Stahlianæ; tum ita dicta Carminativa, v. g. Flor. Chamom. in substantia, vel decocto usurpati, Ess. Cort. Oant. rad. Pimp. alb. Gentianæ; Anisi, vel alia Osa & aromatica post pastum modice sumpta.
- 5.) Legitimum alvi successum promouent potus sufficiens, ☐ us ☐ latus, vel alia Oia digestiva versus pastum exhibita, Ess. Helleb. nigr. saturatio, ad gr. XL. interdum assumenda, cibi lubricantes, v. gr. pruna Damascena. rapæ exsiccatæ, & ad molliorem coctæ, Cremor hordei &c. radix Altheæ subinde administrata.
- 6.) Tonum fibrarum & vasorum, per sanguinem restagnantem nimis distentorum, restituant ac roborant Oia, v. g. Limat. ☐ tenerior cum p. uco Cinamomo & saccharo, occultandi gratia, exhibita, Crocus ☐ aperit, diatæ, Croc. ☐ sacus Ludovici, Croc. Martis

tis c. Oibus Michaëlis, Tinct. Mart. cydoniata, cum succo pom. or. Porsdoiff. perata, Tinct. Mart. Hel-leborata Wedelii, Ess. Oli. ☐is Ludovici, cujus in hoc affectu encomia vid. in Hist. morborum Vir-tris v. grall. p. 27. porro Acidule, & pleraque vulgo splenetica dicta, imprimis Ess. Adiant. alb. & Mil-  
l. fol. denique Oia XL. Urinosa.

#### V. Methodus medendi.

- 1.) In graviore pathematum horum exacerbationibus, præsertim anxietate præcordiali enormiori, respiciendi difficultate, palpitacione cordis, conjunctis, & aëritate, imo potissima adfrictione alvi, ut stre sit exordium, necis, ante omnia alvus aperiat id quod commodissime per enema obtinetur.
- 2.) Ipse vero spasticæ tensionis, & stultentia pathemata, efficaciter, & fere certius sub guntur atque sedantur per pulveres Oosos & Cinnabarinos, quam Opiata & Carminativa calidiora & acriora.
- 3.) Extra paroxysmos vero ventilatio sanguinis est instituenda, per VSes circa Equinoctia repetendas, tum diu & attenuatio ejusdem tentari potest, magis tamen per subsidia dietetica, potum & motum antistorem, quam per remedia pharmaceutica.
- 4.) His præmissis, denique locum habent Oia & Oia Lia, conjuncto semper, & subjuncto potu sufficiente, & motu proportionato.

#### VI. Cautela Practica.

- 1.) Plus valet in hoc affectu curando, aut ad minimum murgando, Diæta, quam Pharmacia.

#### 1.) Diæta

- 2.) Diæta tamen nimis anxia & scrupulosa nullo modo est suadenda.
- 3.) Ventilationes sanguinis in hoc morbo adeo sunt necessariæ, ut, nisi illæ debito tempore, & s. q. adornentur, reliqua consilia, regi. nina & medicaciones plane sint irritæ; tanto magis, si excretiones spontaneæ, aut evacuationes artificiales præcesserint.
- 4.) Si pathemata magis circa sinistrum latus, sub costis ejus lateris affligant, cum angustis & anxietatibus, tam physicis, quam moralibus, mœrore timido, &c. præstat in pede venam secare; Sin non in dextro magis latere, aut abdomine molestæ illæ tensiones & pressiones sentiantur, tunc potest etiam in brachio V. S. celebrari. nisi forte peculiaris dispositio vertiginis circa caput, aut sensibilibus vitiorum in pectore subit: tunc enim V. S. in pede tutior.
- 6.) Quando affectus jam adeo devolutus est, ut excretiones hæmorrhagicas per Vomitum, aut mictum cruentum, imò etiam Hæmorrhoides, respiciat, abusus Myrrhatorum, & Aloëticorum sollicitè vitandus est.
- 6.) Martialia non dantur, nisi 1.) præmissa ventilatione debita, & dilutione atque attenuatione sanguinis, 2.) dosibus minimis, sed per aliquod tempus continuandis, 3.) subjuncto, & conjuncto motu proportionato, 4.) neque etiam, ubi calor præternaturalis, aut profundioris labis in viscere aliquo justa suspicio adest.
- 7.) Eadem quoque monita circa acidularum usum tenenda, utpote quæ non, nisi largiori quantitate haustæ

- haustæ; desideratum effectum præstare solent; Phthificis verò, imò in genere omnibus, qui tene-riore & aridore corporis habitu sunt præditi, certissime nocent.
- 9.) Limatura ꝑ. cruda si quis uti consultum duxerit, attendat, num post ejus usum ructus nidorosi & veluti alliacei surgant, ac spontanea laxatio alvi cum egestione sæcum nigricantium sequatur: hæc enim signa felicitis operationis sunt, atque ulteriorem continuationem permittunt.
  - 9.) Hypochondriacis vertiginosis, aut de memoriæ debilitate conquerentibus, Cucuphæ illæ, aromaticis & nervinis calidis suffardæ, raro conferunt, sæpissime verò nocent: magis necessarium est eos mœnere, ut præcordia, & partes inferiores, imprimè verò pedes à frigore præmuniant.
  - 10.) Malum hysterium in feminis eadem fere ratione tractari debet, ac Malum hypochondriacum in viris: nisi quod illic primaria ratio Blum & aliarum Uteri expurgationum per Lochia, secundinarum &c. excretionum habenda sit.
  - 11.) Dolores capitis, præsertim cum frigoris cujusdam sensu affligentes, nihil æque efficaciter sublevent, quam ꝑ. Camph. impr. post præmissam debitam ventilationem sanguinis, alvo prius expedita, & internum orgasmum temperantibus, & pediluvii conjunctis.
  - 11.) Graviore Mali Hypochondriaco-Hysterici exacerbationes satis promptè quidem per Opiata sedantur; est non sine duplici hoc incommodo, 1) ut in posterum antò citius & vehementius recrudescant, & 2.)
- S non

non solum alias efficaces medicationes . sed & has ipsas per Opiata consopitiones , postmodum aspernentur.

- 13.) Castoreum tamofum quidem , sed fumofum nimis medicamentum est , & facile caput obnubilat , atque præcordiorum anxietates auget . Præstat itaque in nau-seabundis , vomibundis , & sursum vergentibus anxietatibus , eodém abstinuiffe.

- 14.) Millefolium specifi-â quidem , in turbis circa Venam P. moderandis , efficacia pollet ; atramen in hæmorrhoidariis ejus usus consultius omittitur , & rectius in fœminis , ad laboriosiores & sum succellum promovendum & expediendum , adhibetur.

## ASTHIMATE CONVULSIVO.

### Hujus

#### I. Signa sunt

- 1.) Difficilis & laboriosa respiratio;
- 2.) Imò ejusdem veluti oppressio ad suffocationis usque periculum,
- 3.) Per periodos affigens , sive notabiles remissiones & exacerbationes formans.
- 4.) Quæ exacerbationes statò interdum tempore , impr. verò circa primam noctem , recurrunt,
- 5.) Et sæpe ad unam , vel alteram horam durant,
- 6.) Cum sudoris anxii eruptione , Cordis palpitatione , inflatione.
- 7.) Faciei , & vasorum circa tempora , turgescencia , vel alvi quoq; segnitie , imò sensibili adstrictione,
- 8.) Sine itertore & infarctu sensibili pulmonum.

#### II. Subjectum.

- 1.) Evenit familiarius plethoricis , ventilationibus sanguinis , scarificationibus in scapulis & humeris assuetis , mobiliori aliâ , jam sedentariæ magis vitæ deditis : fœminis & sum suppreSSIONE , aut insufficiente successu laborantibus , it. hypochondriacis , hæmorrhoidariis , podagricis.
- 2.) Admod. teneræ ætati non facillè obtingit , nisi aliis affectibus acutis forte superveniat.

#### III. Prognosis.

- 1.) Atticus est mali moris & ominis.
- 2.) Quodsi non protinus jugulet , facillè tamen recrudescit,



lit, aut graviore affectus post se trahit, in junioribus convulsivos, in mediocri ætate acutos febriles, aut hæmoptycos, quin Catarrhum suffocativum.

- 3) In ætate tenuiore aliis morbis acutis superveniens, plurimum lethalis exitus prodromus est.

#### V. Remedia.

- 1.) Causam materialem (sc. plethoram.) respiciunt V. Sio in pede, vel brachio, scarificationis consuetæ continuatio, fluxus & hæmorrhoidalis promotio per medicamenta appropriata, vel applicationem hirudinum.
- 2.) Sanguinis turgescientiam componunt Qsa, & antispasmodica.
- 3.) Spasticam Mesenterii stricturem leniunt & expediunt laxantia, ubi @ fulminans præ cæteris commendatur, & Enemata.
- 4.) Motus exacerbatos sedant & mitigant Anodyna v. g. MP. de Cynogl. Sanguinem circa præcordia congestum & restagnantem discutunt Alexipharmaca & diaphoret. v. g. Mixt. simplex.
- 5.) Motuum ad pectus directorem nimium impetum revellunt Vesicatoria genubus applicata, blandius eundem avocant Pediluvia.

#### V. Methodus medendi.

##### 2) In paroxysmo:

- a.) Vestimenta circa thoracem laxentur, deducatur patienti in aërem liberiores.
- b.) Alvus expidiatur per Clysterem, etiam paulo acriusculum, ubi in cala necessitatis sola urina solida adhiberi poterit.
- γ.) V. Sio, si æger, antea similem paroxysmum exper-

III

tus, eandem adhiberi, instituitur in brachio vel, si affectus lenior, in pede, sed paulo largior.

- 2.) Subjungantur ad sanguinis circa thoracem congesti discussionem Alexipharm. cum moderato regimine diaphoretico.

- 3.) Interponantur temperantia Qsa, quibus, si affectus vehementia valde urgeat, & periculum in mora esse videatur, lenæ anodyna addi possit.

##### 2.) Extra-Paroxysmum.


- 1.) Scarificationes consuetæ continuentur, Hæmorrhoidum & @ium successus promoveatur.
- 2.) V. Sio circa æquinoctia instituitur in pede, præmissis & subjunctis pediluvii.
- 3.) Partium tonus roboretur per MRam tonico-nervinam, ex spirita C. C. & Tinct. gii, vel @is Qri, cujus hic dupla quantitas priori potest addi.

#### VII. Cautela Practica.

- 1.) Affectus hic, si regimine nimis valido diaphoretico tractetur, facile in febre Synocham degenerat; sin puris refrigerantibus & temperantibus supprimatur, palpitationem cordis chronicam post se trahit.
- 2.) Anodynorum usum alvi apertio, & Salium Alium exhibitionem (quod tamen in paroxysmo melius omittitur.) V. Sio præcedat.
- 3.) In ætate provectiore, aut ubi paræmata hypochondriaca simul concurrunt, consilium V. S. in pede instituitur, præmissis, & subjunctis singulis, vel alternis septimanis, pediluvii.
- 4.) Qui tamen à multis retro annis eandem in brachio celebrant, poterunt huic consuetudini insistere.
- 5.) Concurrat plerumque cum Asthmate tali convulsivo aliquis motus & æstus febrilis, qui Opiatis exacerbatur.

bari





2734/72



